

เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๒๓/๒๕๔๒



Technical Paper No.23/1999

โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสลิคในประเทศไทย
Population Genetic Structures of the Snakeskin Gourami,
Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) in Thailand

นวลมณี พงศ์ธนา

Nuanmanee Pongtana

แสงทอง ประเสริฐวิริยะกุล

Sangthong Prasertwiriyaikul

พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล

Puttharat Baoprasertkul

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
กรมประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

National Aquaculture Genetics Research Institute

Department of Fisheries

Ministry of Agriculture and Cooperatives

โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสร้อยในประเทศไทย

Population Genetic Structures of the Snakehead

นวลมณี พงศ์ธนา แสงทอง ประเสริฐวิริยะกุล และ พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล

Nuanmanee Pongthana, Sangthong Prasertwiriyeekul และ พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล

บทคัดย่อ

การตรวจสอบความแตกต่างของประชากรปลาสร้อยโดยศึกษาจากไอโซไซม์นั้น ควรทดสอบหาไอโซไซม์ ชนิดบัฟเฟอร์และอวัยวะที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบก่อน จากการนำตัวอย่างปลาสร้อยมาตรวจหาไอโซไซม์ในบัฟเฟอร์ Tris – citrate pH 7.0 และ pH 8.0 และบัฟเฟอร์ Tris – EDTA – borate pH 8.0 และ pH 8.3 โดยทดสอบกับไอโซไซม์ 14 ชนิด คือ AAT, AK, EST, FUM, GCDH, PGI, HK, IDDH, MDH, ME, MPI, PGDH, PGM และ PK ใช้กล้ามเนื้อ ตับ ไต เลือด และหัวใจเป็นอวัยวะทดสอบ พบว่าตับเป็นอวัยวะที่สามารถใช้ตรวจหาไอโซไซม์เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสร้อยได้มากที่สุดและให้ผลดีเมื่อใช้บัฟเฟอร์ Tris – citrate pH 8.0

จากการตรวจสอบไอโซไซม์ของประชากรปลาสร้อยที่รวบรวมจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ พิชณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี และปัตตานี พบว่าประชากรปลาสร้อยจากจังหวัดสมุทรปราการและพิษณุโลกมีค่า genetic identity สูงที่สุดเท่ากับ 0.985 ค่า genetic distance ต่ำที่สุดเท่ากับ 0.015 ส่วนประชากรปลาสร้อยจากจังหวัดพิษณุโลกและปัตตานีมีค่า genetic identity ต่ำสุดเท่ากับ 0.923 และมีค่า genetic distance สูงสุดเท่ากับ 0.080 แสดงให้เห็นว่าประชากรปลาสร้อยจากจังหวัดสมุทรปราการและพิษณุโลกมีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมมากที่สุด

จากการศึกษาลักษณะภายนอกของประชากรปลาสร้อยที่รวบรวมจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง พบว่าปลาสร้อยจากจังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะภายนอกแตกต่างจากปลาสร้อยจากแหล่งอื่น ๆ มากที่สุดโดยมีค่าอัตราส่วนความยาวหัวต่อความยาวลำตัวมาตรฐานเท่ากับ 0.32 ส่วนปลาสร้อยจากจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะภายนอกไม่แตกต่างจากปลาสร้อยจากจังหวัดสุพรรณบุรี และปลาสร้อยจากจังหวัดอุบลราชธานีมีลักษณะภายนอกไม่แตกต่างจากปลาสร้อยจากจังหวัดปัตตานี โดยมีอัตราส่วนความยาวหัวต่อความยาวลำตัวมาตรฐานเท่ากับ 0.28 และ 0.27 ตามลำดับ

Population Genetic Structures of the Snakeskin Gourami,
Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) in Thailand

Nuanmanee Pongthana, Sangthong Prasertwiriyaikul and Puttharat Baoprasertkul

Abstract

Population structures of the snakeskin gourami, *Trichogaster pectoralis* (Regan, 1910) could be distinguished by detecting isozyme differences, which depending on kinds of buffer, pH of buffer and the organ. This study used both Tris – Citrate buffer pH 7.0 and 8.0 and Tris – EDTA – Borate buffer pH 8.0 and pH 8.3 to test 14 enzymes, AAT, AK, EST, FUM, GCDH, PGI, HK, IDDH, MDH, ME, MPI, PGDH, PGM and PK, in five organs (muscle, liver, kidney, blood and heart). Most isozymes could be detected clearly in liver which showed clear bands when used Tris – Citrate buffer pH 8.0.

From the allozyme study on five populations of the snakeskin gourami collected from five locations in Thailand (Samutprakan, Pitsanulok, Suphanburi, Ubonratchathani and Pattanee), the highest genetic identity coefficients of 0.985 was found between Samutprakan and Pitsanulok populations. The lowest genetic identity coefficients of 0.923 was found between Pitsanulok and Pattanee populations. From the estimates of genetic identity coefficients and genetic distance coefficients of five populations, the Samutprakan and Pitsanulok populations had the lowest genetic distance, Pitsanulok and Pattanee populations had the highest genetic distance.

From the morphometric study on the five populations of the snakeskin gourami by comparing the ratio of head length and standard length, the fish from Pitsanulok was different from others. The fish from Samutprakan and Supanburi had the same head length and standard length ratio of 0.28 and the fish from Ubonrachathanee and Pattanee had the same ratio of 0.27.

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(2)
สารบัญภาพ	(3)
คำนำ	1
วัตถุประสงค์	1
การตรวจเอกสาร	1
อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ	9
ผลการศึกษา	16
วิจารณ์ผล	45
สรุปและข้อเสนอแนะ	48
กิตติกรรมประกาศ	49
เอกสารอ้างอิง	49
ภาคผนวก	53

กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ

ตารางที่	หน้า
1 ผลการศึกษาหาไอโซไซม์ ชนิดบัฟเฟอร์ และอวัยวะที่เหมาะสมในการตรวจสอบประชากรปลาสด	18
2 สรุปแผนการทดลองเพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง	19
3 ค่าความถี่อัลลีลของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง	27
4 ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตี (unbiased heterozygosity) ทุกโลไซของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง	29
5 ค่าเฉลี่ยเฮตเทอโรไซโกซิตีต่อโลกัสของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง	30
6 ค่าไคมีสแควร์ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการ	31
7 ค่าไคมีสแควร์ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำในจังหวัดพิษณุโลก	33
8 ค่าไคมีสแควร์ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรี	35
9 ค่าไคมีสแควร์ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำในจังหวัดอุบลราชธานี	37
10 ค่าไคมีสแควร์ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำในจังหวัดปัตตานี	39
11 ค่าสัมประสิทธิ์ genetic identity และ genetic distance ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง	41
12 อัตราส่วนความยาวหัวต่อความยาวลำตัวมาตรฐานของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง	43

ภาพที่

หน้า

- 1 แผนที่แสดงสถานที่เก็บตัวอย่างปลาสดจำนวน 5 แหล่ง 11
- 2 ลักษณะภายนอกของปลาสดที่ทำการศึกษา 15
- 3 รูปแบบไอโซไซม์ AK ของไต (a) และตับ (b) ปลาสด 22
- 4 รูปแบบไอโซไซม์ EST ของกล้ามเนื้อ (a) และหัวใจ (b) ปลาสด 22
- 5 รูปแบบไอโซไซม์ ME ของกล้ามเนื้อ (a) และหัวใจ (b) ปลาสด 23
- 6 รูปแบบไอโซไซม์ PGDH ของตับ (a) และไต (b) ปลาสด 23
- 7 รูปแบบไอโซไซม์ PGI ของไตปลาสด 24
- 8 รูปแบบไอโซไซม์ PGM ของไตปลาสด 24
- 9 รูปแบบความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง 41
- 10 ตัวอย่างปลาสดที่รวบรวมจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง (บน : ตัวผู้ ; ล่าง : ตัวเมีย)
(a) สมุทรปราการ (b) พิษณุโลก (c) สุพรรณบุรี (d) อุบลราชธานี (e) ปัตตานี 44

1. คำนำ

ปลาสลิด (Snakeskin gourami) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Trichogaster pectoralis* (Regan, 1910) เป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง สามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายชอบอาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง ไม่ค่อยมีโรคและพยาธิมาเบียดเบียน ราคาดี รสชาติดี นิยมบริโภคทั้งสดและแห้ง มีไข่ดก อายุเพียง 6-7 เดือนก็สามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ และเป็นปลาที่สามารถอาศัยในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำ ๆ และสภาพดินเปรี้ยวได้ จากสถิติกรมประมง พ.ศ. 2538 ปลาสลิดให้ผลผลิตมากเป็นอันดับ 4 ของผลผลิตสัตว์น้ำจืดทั้งหมดประมาณ 16,713.65 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 613.4 ล้านบาท จังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งที่มีผลผลิตปลาสลิดมากที่สุด (กรมประมง, 2541) ปลาสลิดที่เลี้ยงหรือพบในแหล่งน้ำธรรมชาติจากแต่ละจังหวัดมีลักษณะภายนอกแตกต่างกัน เช่น สีลาย ความกว้างของลำตัว เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเพราะมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรม อันเป็นผลทำให้ปลาสลิดจากแต่ละแหล่งมีการเจริญเติบโตและรสชาติแตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาสลิดจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงปลาสลิดต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อศึกษาหาไอโซไซม์ ชนิดของบัฟเฟอร์และอวัยวะที่เหมาะสมในการตรวจสอบประชากรปลาสลิด

2.2 เพื่อศึกษาหาความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสลิดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

2.3 เพื่อศึกษาลักษณะภายนอกของประชากรปลาสลิดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

3. การตรวจเอกสาร

ปลาสลิดหรือปลาใบไม้เป็นปลาไทยแท้ มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาคกลางของประเทศไทย พบในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเช่นกัน เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ปากีสถาน อินเดีย พม่า ลาว เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งมีหลักฐานว่าได้รับพันธุ์ปลาสลิดไปจากประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ (เจียมจิตต์, 2528) ดร.สมิท (Dr. Hugh M. Smith) อดีตนักมินวิทยาระดับโลกได้บันทึกว่าปลาสลิดที่แพร่กระจายในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นเป็นพันธุ์ปลาจากเมืองไทย ซึ่งเป็นปลาสลิดที่ได้จากดอนกำยาน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพันธุ์ปลาสลิดที่มีชื่อเสียง มีลักษณะเด่นคือ

Sparidae สามารถใช้ไอโซไซม์ MDH เป็นตัวตรวจสอบความแตกต่างของชนิดได้ และอวัยวะที่ใช้ตรวจสอบดีที่สุดคือกล้ามเนื้อ

Dey (1984) รายงานว่าปลา *Salmo gairdneri* มีระดับการทำงานของ MDH สูงสุดในกล้ามเนื้อและต่ำสุดในสมอง ซึ่งเป็นการสำรวจในปลาทุกกลุ่มอายุ Salvatorelli และคณะ (1987) รายงานว่าปลา *Sparus aurata* อายุ 45 วัน มีรูปแบบของไอโซไซม์ MDH คล้ายกับรูปแบบในตัวเต็มวัย ปลา *Diplodus sargus* อายุ 38 วัน ก็มีรูปแบบไอโซไซม์คล้ายกับตัวเต็มวัย (D' Amelio และคณะ, 1988) ปลา *D. puntazzo* อายุ 29 วัน มีรูปแบบไอโซไซม์เช่นเดียวกับตัวเต็มวัย (Basaglia และคณะ, 1990) ในปลา African cichlids พบว่า MDH ทำงานได้ดีในหลายอวัยวะ คือ ตา หัวใจ ตับ และกล้ามเนื้อ (Bank และคณะ, 1989) Farias และคณะ (1992) ศึกษาปลาตระกูล cichlids ใน Amazon hydrographic basin จำนวน 5 ชนิด ปรากฏว่ามีการแสดงออกของยีน 3 โลไซ คือ MDH-A, MDH-B และ MDH-C โดยจะพบ MDH-A ในทุกอวัยวะและจะพบมากที่สุดที่ตับ ส่วน MDH-B พบในกล้ามเนื้อและตา

Koljonen (1986) ศึกษาปลา rainbow trout (*Salmo gairdneri* Richardson) 10 สายพันธุ์ โดย 5 สายพันธุ์มาจากฟาร์มที่เลี้ยงเป็นการค้าในประเทศฟินแลนด์ ส่วนอีก 5 สายพันธุ์มาจากสถานีเพาะเลี้ยงของรัฐ ใช้เทคนิคอิเล็กโตรโฟเรซิสโดยใช้เอ็นไซม์ 9 ชนิด ซึ่งมียีนควบคุมทั้งสิ้น 20 โลไซ พบว่ามี 8 โลไซ ที่เป็นโพลิมอร์ฟิก สายพันธุ์พาณิชย์มีค่า genetic distance น้อยกว่าสายพันธุ์จากสถานีของรัฐ โดยค่าเฉลี่ย genetic distance ของสายพันธุ์จากสถานีของรัฐมีค่าเท่ากับ 0.0513 ส่วนสายพันธุ์พาณิชย์มีค่าเท่ากับ 0.0165

Creech (1991) ศึกษาปลา *Atherina boyeri* และ *A. presbyter* ด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟเรซิส พบว่าต่างชนิดกัน ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาก่อนหน้านี้ โดยใช้เอ็นไซม์ 11 เอ็นไซม์และ general protein ทดสอบกับกล้ามเนื้อและตับ ผลปรากฏว่ามี 8 เอ็นไซม์ที่มีสภาพเป็นโพลิมอร์ฟิก โดยมียีนควบคุมทั้งหมด 16 โลไซ 40 อัลลีล โลกัสที่สามารถใช้จำแนกประชากรได้คือ โลกัส EST-3 และ โลกัส G3PDH ส่วนที่ตำแหน่งโลกัส PGM จะมีลักษณะที่เหมือนกันทั้ง 2 ชนิด เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา Nei's genetic distance (D) ระหว่างกลุ่มประชากรของปลา *A. boyeri* และ *A. presbyter* ได้เท่ากับ 0.42 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปลาทั้ง 2 ชนิดนี้มีพันธุกรรมที่ไม่ชิดกัน

Teugels และคณะ (1992) ศึกษาปลา African clariid catfish จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ *Clarias anguillaris*, *C. ebriensis*, *C. gariepinus* และ *Heterobranchus longifilis* อวัยวะที่ใช้ศึกษาคือกล้ามเนื้อและตับ ใช้เอ็นไซม์ 10 เอ็นไซม์ คือ AAT, CK, FH, GPI, IDHP, LDH, MDH, PGDH, PGM และ SOD ปรากฏว่าปลา *C. anguillaris* และปลา *C. gariepinus* มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมากกว่าปลา *C. ebriensis* ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลทางสัณฐาน รูปแบบเอ็นไซม์ PGM ของปลา *H. longifilis* คือ PGM-85 ส่วนรูปแบบเอ็นไซม์ PGM ของปลา *C.*

ตะไคร่น้ำ รำละเอียด หรือปลายข้าวต้มปนกับผักบุงที่หั่นแล้วเคล้ากับรำป็นเป็นก้อน หรืออาจใช้ อาหารเม็ดสำเร็จรูป อาหารที่เหมาะสมสำหรับปลาวัยอ่อนซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 วัน ถึง 1 เดือน ควร เป็นตะไคร่น้ำหรือไร่น้ำ และเมื่อปลาอายุได้ 21 วัน สามารถให้อาหารพวกรำข้าวละเอียดต้มปนกับ ผักบุงหั่นละเอียด แหนสดหรือปลวก (บุญยรัตน์, 2523)

การแพร่ขยายพันธุ์

การสังเกตลักษณะเพศของปลาสลิดนั้นสามารถสังเกตจากภายนอกได้ชัดเจน ปลาสลิดเพศผู้ โดยทั่วไปจะมีสีเข้มและตัวยาวเรียวกว่าเพศเมีย สันหลังและสันท้องเกือบเป็นเส้นตรงขนานกัน มีครีบ หลังยาวแหลมจรดหลังเลยโคนหาง ส่วนเพศเมียมีสันท้องยาวมนขนานกับสันหลัง และครีบหลังมน ไม่แหลม และสั้นกว่าเพศผู้ พบปลาสลิดมีไข่แก่พร้อมที่จะแพร่ขยายพันธุ์ได้มีขนาดเล็กที่สุด 13 เซนติเมตร (บุญยรัตน์, 2523)

ปลาสลิดจะวางไข่ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน การวางไข่จะชุกราว เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน แต่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมก็ยังมีวางไข่ เรื่อย ๆ มา ปลาสลิดสามารถวางไข่ได้ทั้งในบ่อธรรมชาติและบ่อซีเมนต์ และอาจวางไข่ได้ปีละ 2 ครั้งถ้าปลาสมบูรณ์ (บุญยรัตน์, 2523) โดยจะวางไข่ในแหล่งน้ำนิ่ง เพศผู้จะก่อหวอดในบริเวณที่มี พรรณไม้ขึ้นไม่หนาแน่นมากนัก ปลาเพศผู้จะเริ่มก่อหวอดในตอนบ่ายจนถึงตอนสายของวันต่อมา จึงทำการผสมพันธุ์กับเพศเมีย โดยปลาเพศผู้ 1 ตัว จะผสมกับปลาเพศเมีย 1 ตัวเท่านั้น และปลา เพศผู้จะเป็นผู้รักษาไข่ (บุญยรัตน์, 2523) แม่ปลาสลิดแต่ละตัวจะมีไข่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาด และอายุของปลา กมลพร (2512) รายงานว่าแม่ปลาสลิดหนึ่งตัว จะมีไข่ตั้งแต่ 18,000 – 36,000 ฟอง วิทย์ (2509) รายงานว่าแม่ปลาสลิดหนึ่งตัว วางไข่โดยเฉลี่ย 36,933 ฟอง แม่ปลาสลิดวางไข่ ปีละ 2 ครั้ง ไข่ปลาสลิดเป็นไขลอย มีสีเหลือง มีหยดน้ำมันใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.5 – 2.0 มิลลิเมตร (อุทัยรัตน์, 2536)

การเพาะเลี้ยง

เจียมจิตต์ (2528) รายงานว่าการเพาะเลี้ยงปลาสลิดมีมากในจังหวัดสมุทรปราการและบาง ส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการเลี้ยงโดยอาศัยธรรมชาติอย่างแท้จริง ในหน้าน้ำก็วิดน้ำเข้านา และปล่อยปลาที่เก็บไว้ลงเลี้ยง เกษตรกรมักประสบปัญหาได้จำนวนลูกปลาไม่เพียงพอ ขาดแคลนน้ำ น้ำเค็มหนุน น้ำเปรี้ยวที่เกิดจากดิน ต่อมาได้มีการนำวิธีการเพาะเลี้ยงแบบใหม่เข้ามาช่วย คือการ สร้างล้อมขนาดเล็กไม่เกิน 5 ไร่ สำหรับใช้เพาะพันธุ์ เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง และสะดวกต่อการให้อาหารและปฎิบัติลดจนแก้ปัญหาหน้าเค็ม น้ำเปรี้ยว หรือน้ำเสีย

3.2 เทคนิคอิเล็กโตรโฟเรซิส

ชีวโมเลกุล เช่น กรดอะมิโน เปปไทด์ โปรตีน นิวคลีโอไทด์และกรดนิวคลีอิก เป็นโมเลกุลซึ่งประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันที่สามารถไอออนในสื่อน้ำแล้วได้หมู่ที่มีประจุไฟฟ้าได้ โปรตีนนั้นมีประจุได้เนื่องมาจากการไอออนไนซ์ของหมู่อะมิโน หมู่คาร์บอกซิลและหมู่ฟังก์ชันในสายรอง (side chain) ของกรดอะมิโนที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน ณ ค่าพีเอชหนึ่ง ๆ ของสารละลายกรดอะมิโนแต่ละชนิดจะมีปริมาณประจุใกล้เคียงกัน แต่จะมีอัตราส่วนของประจุต่อมวล (charge / mass ratio) ต่างกัน เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลที่แตกต่างกัน ความแตกต่างในปริมาณประจุสุทธิและความแตกต่างในอัตราส่วนของประจุต่อมวลนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ทำให้ไอออนต่าง ๆ เคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน เราเรียกการเคลื่อนที่ของไอออนในสนามไฟฟ้านี้ว่า "อิเล็กโตรโฟเรซิส"

อิเล็กโตรโฟเรซิสเป็นเทคนิคทางชีวเคมีที่มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการแพทย์ สำหรับการชันสูตรโรค และการแยกชีวโมเลกุลต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากเทคนิคนี้สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงในการแยกชีวโมเลกุลที่มีประจุซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ เช่น โปรตีน เอนไซม์ ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ เป็นต้น การแยกสารเหล่านี้จะต้องเลือกใช้ชนิดของอิเล็กโตรโฟเรซิสที่เหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแยกซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หลักในการเลือกนั้นอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของสารที่ต้องการจะแยก พร้อมทั้งพิจารณาเลือกใช้ชนิดของตัวกลางค้ำจุนที่เหมาะสมกับชนิดของสารดังกล่าว ในการแบ่งประเภทของอิเล็กโตรโฟเรซิสมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งหลายประเภท ดังต่อไปนี้

แบ่งตามเทคนิคการใช้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) อิเล็กโตรโฟเรซิสแบบอนุภาค เป็นการนำอิเล็กโตรโฟเรซิสไปใช้ในการศึกษาสมบัติของสารในทางเคมีฟิสิกส์ สารนั้นอาจจะเป็นสารประเภทสารแขวนลอย หรืออิมัลชัน (emulsion) ซึ่งอยู่ในรูปของอนุภาคหรือหยดเล็กมากและต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อติดตามการเคลื่อนที่อนุภาค เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาลักษณะพื้นผิวของจุลินทรีย์

2) อิเล็กโตรโฟเรซิสแบบขอบเคลื่อนที่ เป็นอิเล็กโตรโฟเรซิสชนิดแรกที่เริ่มมีบทบาทสำคัญในการศึกษาโมเลกุลทางชีวเคมี A. Tiselius นักชีวเคมีชาวสวีเดน เป็นผู้พัฒนาเทคนิคนี้

3) โซนอิเล็กโตรโฟเรซิส จะแตกต่างจากสองประเภทแรก คือ เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของสารในสนามไฟฟ้าโดยมีตัวกลางที่เฉื่อย (inert) เป็นของแข็งหรือเจล เช่น กระดาษกรอง เซลลูโลสอะซิเตท (cellulose acetate) สตาร์ชเจล (starch gel) อาการ์ (agar) อากาโรส (agarose) และโพลิอะคริลอไมด์ (polyacrylamide) โมเลกุลที่แยกออกจากกันจึงปรากฏเป็นแถบบนตัวกลางที่รองรับสารนั้นๆ เทคนิคอิเล็กโตรโฟเรซิสประเภทโซนอิเล็กโตรโฟเรซิสนี้มีบทบาทสำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดการเจริญพัฒนาในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุก ๆ สาขา อีกทั้งมีบทบาทอย่างกว้างขวางใน

การแยกและตรวจสอบสารต่าง ๆ เพื่อการวินิจฉัยโรคและลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (วิลเลียมส์ และคณะ, 2528)

แบ่งอิเล็กโตรโฟรีซิสตามชนิดของตัวกลางค้ำจุนออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1) เปเปอร์อิเล็กโตรโฟรีซิส ใช้กระดาษเป็นตัวกลางค้ำจุน นิยมแยกสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก เช่นกรดอะมิโน แต่ประสิทธิภาพการแยกต่ำกว่าชนิดอื่น

2) เซลลูโลส - อะซิเตทอิเล็กโตรโฟรีซิส ใช้เซลลูโลส - อะซิเตทเป็นตัวกลางค้ำจุน นิยมใช้ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อชั้นสูตรโรคเพราะสะดวกรวดเร็ว แต่ราคาแพง

3) อากาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส ใช้อากาโรสเป็นตัวกลางค้ำจุน นิยมใช้แยกโปรตีนทางอิมมูโนวิทยา

4) โพลีอะคริลอไมด์เจลอิเล็กโตรโฟรีซิส ใช้โพลีอะคริลอไมด์เป็นตัวกลางค้ำจุน เป็นเทคนิคที่นิยมใช้แพร่หลายในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ แต่ขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง และผู้ปฏิบัติการต้องมีความชำนาญ

5) สตาซเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส Smithies เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำสตาซเจลใช้เป็นตัวกลางค้ำจุนในการทำอิเล็กโตรโฟรีซิสสำหรับแยกโปรตีนในซีรัม

ตัวกลางค้ำจุนที่นำมาใช้กับเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิสแบบต่าง ๆ ส่วนมากเป็นสารที่มีคุณสมบัติเฉื่อย ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีหรือฟิสิกส์กับสารที่ต้องการแยก และทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สารซึ่งเคลื่อนที่แยกออกจากกันแล้วเคลื่อนกลับมาปนกันได้ง่าย โดยการทำให้สารดังกล่าวเคลื่อนที่ไปในทางที่จำกัด ตัวกลางค้ำจุนส่วนใหญ่จะเป็นสารที่มีรูพรุนขนาดใหญ่กว่าขนาดโมเลกุลของสารที่ต้องการแยก ดังนั้นสารจะเคลื่อนที่ผ่านรูพรุนได้อย่างอิสระ และจะเคลื่อนที่แยกจากกันตามความแตกต่างของจำนวนประจุบนโมเลกุล

3.3 หลักการแยกสารโดยวิธีสตาซเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส

กระบวนการอิเล็กโตรโฟรีซิสเป็นการเคลื่อนที่ของชีวโมเลกุลที่มีประจุจากขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม ในการวิเคราะห์และแยกโมเลกุลด้วยวิธีนี้จึงจำเป็นต้องจัดสภาพตัวทำละลายให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้โมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าสุทธิเป็นบวกหรือลบและมีประจุมากหรือน้อยตามต้องการ จึงจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องพีเอช พีเค และการไอออนไนซ์ของหมู่ฟังก์ชันในชีวโมเลกุลแต่ละชนิด เพื่อที่จะได้วางแผนการทดลองได้อย่างเหมาะสม (Whitmore, 1990) องค์ประกอบที่ควรพิจารณาในการแยกสารโดยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิส ได้แก่ อนุภาคที่มีประจุ ตัวกลางค้ำจุนและสนามไฟฟ้า นอกจากนี้ต้องเลือกบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประจุบนโมเลกุลเป็นประจุบวกหรือลบตามต้องการ และต้องคำนึงถึงความคงทนของโมเลกุลต่อสภาพแวดล้อมที่จะทำการทดลองด้วย เช่นโปรตีนหนึ่งอาจจะเสียสภาพง่ายเมื่ออยู่ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีค่าพีเอชสูง (เพื่อให้ได้ประจุสุทธิเป็น

ลบ) ก็อาจต้องเลือกใช้โปรตีนที่เป็นประจุบวกแทน การพิจารณาเลือกตัวกลางค้ำจุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้องคำนึงถึงความสะดวกในการสกัดโมเลกุลที่แยกได้นั้นออกจากตัวกลางและควรให้เกิดการแพร่กระจายของสารที่แยกชัดเจนที่สุด สนามไฟฟ้าที่ใช้ต้องพิจารณาว่าจะกำหนดให้กระแสไฟฟ้าคงที่หรือความต่างศักย์คงที่ สำหรับงานวิเคราะห์ที่ใช้เวลาทำอิเล็กโตรโฟเรซิสน้อย เช่น แยกไอโซไซม์ (isozyme) ไลโปโปรตีน (lipoprotein) มักเลือกความต่างศักย์คงที่ เพื่อให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วที่สุด ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ ลดอัตราเสี่ยงของการเสียสภาพของเอนไซม์ และลดอิทธิพลของการแพร่กระจาย (ธนิต, 2528)

ขั้นตอนการทำสตาซเจลอิเล็กโตรโฟเรซิส

1) การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง

การทำสตาซเจลอิเล็กโตรโฟเรซิสกับไอโซไซม์ จะพบการสลายตัวของเอนไซม์ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมตัวอย่าง อัตราการสลายตัวของเอนไซม์จะแตกต่างกันไปตามชนิดของเอนไซม์ ดังนั้นการรวบรวมตัวอย่างจึงควรเก็บรักษาในน้ำแข็งแห้งตั้งแต่เริ่มทำการรวบรวมตัวอย่าง ถ้าต้องการเก็บรักษาตัวอย่างไว้นานประมาณ 2-3 วันหรือสัปดาห์เดียว ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แต่ถ้าต้องการเก็บรักษาตัวอย่างไว้นานกว่านั้นควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -40 ถึง -80 องศาเซลเซียส ถ้าตัวอย่างที่เก็บรักษามีขนาดเล็ก เช่น ปลายนิ้วอ่อนสามารถเก็บรักษาได้ทั้งตัว แต่ถ้าตัวอย่างมีขนาดใหญ่ควรเก็บรักษาแต่อวัยวะที่มีเอนไซม์ที่ต้องการทำการศึกษา อวัยวะที่นิยมใช้กันมากได้แก่ กล้ามเนื้อ หัวใจ ตับ ไต เลือด ครีบ และตา (Macaranas, 1991)

2) การเตรียมเนื้อเยื่อ

นำตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้มาปล่อยให้ละลายเองในอุณหภูมิปกติประมาณ 10-20 นาที ตัดตัวอย่างให้มีขนาดประมาณ 0.5 กรัม นำตัวอย่างมาเจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ และแช่ในช่องแช่แข็งเพื่อทำการย่อยสลาย จากนั้นนำไปทำการตกตะกอน การบรรจุตัวอย่างเพื่อทำอิเล็กโตรโฟเรซิสนิยมทำครั้งละ 20-30 ตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างควรทำบนน้ำแข็งหรือในห้องเย็นเพื่อใช้ความเย็นในการรักษาไม่ให้เอนไซม์เกิดการสูญเสียไป (Wiseman, 1987)

3) การเตรียมสตาซเจล

ซึ่งแบ่งตามปริมาณที่ต้องการใส่ในขวดรูปชมพู่ที่มีท่อสำหรับดูดอากาศออก ใส่สารละลายบัฟเฟอร์ ละลายให้เข้ากัน ให้ความร้อนด้วยตะเกียงเบนซีนจนสารละลายมีความหนืดมากขึ้นแล้วกลับค่อย ๆ ใส่ขึ้น ขณะที่ให้ความร้อนจะต้องทำการเขย่าให้เนื้อสารละลายเข้ากันและไม่ให้เนื้อแบ่งจับเป็นก้อน ซึ่งจะขัดขวางการเคลื่อนที่ของอนุภาคในตัวกลาง (Macaranas, 1991) เมื่อให้ความร้อนจนกระทั่งใกล้เดือดแต่ไม่ถึงจุดเดือด นำมาดูดอากาศในสารละลายออกให้หมดโดยการบีบอากาศออก ถ้าดูดอากาศออกไม่หมดฟองอากาศจะไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของอนุภาคในตัวกลาง (Whitmore, 1990) จากนั้นนำสารละลายมาเทลงบนโมลด์ (mold) ที่เตรียมไว้ ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ

ขึ้นระหว่างการเท นำกระจกมาปิดทับหน้าเพื่อให้แผ่นเจลเรียบ ทิ้งเจลไว้ให้เย็นในอุณหภูมิห้อง กิ่งก้านสาขาของโมเลกุลอะมิโนเลเปกตินในแป้งจะเกี่ยวพันกันทำให้เกิดเป็นเจล (วิลเล็คซัน, 2528) ก่อนจะทำการบรรจุตัวอย่างลงบนแผ่นเจลให้นำแผ่นเจลมาแช่ในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 – 60 นาที นำเจลมาตัดออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งมีขนาดใหญ่ให้เป็นขั้วบวก ส่วนเล็กให้เป็นขั้วลบ บรรจุตัวอย่างโดยนำกระดาษกรองชิ้นเล็ก ๆ ขนาดเท่า ๆ กันมาจุ่มในเนื้อเยื่อที่เตรียมไว้ ปลอຍให้สารละลายจากเนื้อเยื่อซึมเข้ากระดาษ นำกระดาษกรองเหล่านั้นมาบรรจุลงแผ่นที่ตัดแบ่งไว้เป็นสองส่วน โดยใส่ตรงบริเวณที่ตัดแบ่งไว้ ให้ปลายกระดาษด้านหนึ่งติดไว้กับพื้นกระจก และอีกปลายหนึ่งให้พ้นหน้าเจลชิ้นใหญ่ หลังจากนั้นก็ประกบชิ้นเจลทั้งสองให้แนบชิดกัน

นำเจลมาวางบนตรงกลางของอ่างบัฟเฟอร์ (electrophoresis chamber) ใช้ปลายด้านหนึ่งของกระดาษหรือผ้าจุ่มกับบัฟเฟอร์ที่เตรียมไว้ในอ่างบัฟเฟอร์ ส่วนอีกด้านหนึ่งวางบนแต่ละด้านของขอบเจลเพื่อให้กระแสไฟฟ้าวิ่งได้อย่างทั่วถึง นำอ่างบัฟเฟอร์มาต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟ (power supply) ตั้งกระแสไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้าให้คงที่ และตั้งเวลาที่ต้องการทำอิเล็กโตรโฟรีซิสประมาณ 3-5 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและ pH ของบัฟเฟอร์ เมื่อครบกำหนดเวลาก็นำแผ่นเจลมาตัดเป็นแผ่นบาง ๆ ทำการย้อมด้วยสีหรือเอ็นไซม์ที่เตรียมไว้ ก็จะสามารถเห็นแถบการเคลื่อนที่ของเอ็นไซม์ที่ต้องการศึกษาได้

3.4 ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม

Ferguson และ Mason (1981) ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลา brown trout บริเวณชายฝั่งตะวันตกของประเทศไอร์แลนด์ พบปลา brown trout 4 สายพันธุ์ โดยดูจากลักษณะภายนอก ได้แก่ Ferox, Gillaroo, Sonaghen และ Normal brown trout จากการศึกษาตาของปลาจากทุกแหล่ง ๆ ละ 30 ตัวอย่าง พบว่ามี 3 โลไซ ที่บอกความแตกต่างของแต่ละประชากร ปลาในทะเลสาบแห่งสุดท้ายที่ห่างจากแหล่งอื่น ๆ มากมีค่าทางพันธุกรรมแตกต่างไปอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไปมีผลทำให้สัตว์น้ำมีพันธุกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม

Basaglia (1990) ศึกษาปลาในครอบครัว Sparidae จำนวน 15 ชนิด โดยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสในไอโซไซม์ MDH โดยใช้อวัยวะ 7 อวัยวะในการศึกษา พบว่ารูปแบบการทำงานของไอโซไซม์ในปลา 2 ชนิด คือ *Sparus aurata* และ *S. pagrus* มีรูปแบบที่เหมือนกัน แสดงให้เห็นว่ามีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมากกว่าชนิดอื่น ๆ ในขณะที่ชนิดอื่น ๆ เมื่อศึกษาในส่วน of retina จะมีรูปแบบการทำงานของไอโซไซม์ MDH ที่เฉพาะเจาะจงแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน และในส่วน of หัวใจ พบว่ามีเพียง soluble MDH เท่านั้นที่ทำงานในปลา 5 ชนิดนี้ คือ *Pagellus acarne*, *Diplodus annularis*, *D. vulgaris*, *Boops boops*, และ *Sarpa salpa* สรุปได้ว่าปลาในครอบครัว

Sparidae สามารถใช้ไอโซไซม์ MDH เป็นตัวตรวจสอบความแตกต่างของชนิดได้ และอวัยวะที่ใช้ตรวจสอบที่ดีที่สุดคือกล้ามเนื้อ

Dey (1984) รายงานว่าปลา *Salmo gairdneri* มีระดับการทำงานของ MDH สูงสุดในกล้ามเนื้อและต่ำสุดในสมอง ซึ่งเป็นการสำรวจในปลาทุกกลุ่มอายุ Salvatorelli และคณะ (1987) รายงานว่าปลา *Sparus aurata* อายุ 45 วัน มีรูปแบบของไอโซไซม์ MDH คล้ายกับรูปแบบในตัวเต็มวัย ปลา *Diplodus sargus* อายุ 38 วัน ก็มีรูปแบบไอโซไซม์คล้ายกับตัวเต็มวัย (D'Amelio และคณะ, 1988) ปลา *D. puntazzo* อายุ 29 วัน มีรูปแบบไอโซไซม์เช่นเดียวกับตัวเต็มวัย (Basaglia และคณะ, 1990) ในปลา African cichlids พบว่า MDH ทำงานได้ดีในหลายอวัยวะ คือ ตา หัวใจ ตับ และกล้ามเนื้อ (Bank และคณะ, 1989) Farias และคณะ (1992) ศึกษาปลาตระกูล cichlids ใน Amazon hydrographic basin จำนวน 5 ชนิด ปรากฏว่ามีการแสดงออกของยีน 3 โลไซ คือ MDH-A, MDH-B และ MDH-C โดยจะพบ MDH-A ในทุกอวัยวะและจะพบมากที่สุด ส่วน MDH-B พบในกล้ามเนื้อและตา

Koljonen (1986) ศึกษาปลา rainbow trout (*Salmo gairdneri* Richardson) 10 สายพันธุ์ โดย 5 สายพันธุ์มาจากฟาร์มที่เลี้ยงเป็นการค้าในประเทศฟินแลนด์ ส่วนอีก 5 สายพันธุ์มาจากสถานีเพาะเลี้ยงของรัฐ ใช้เทคนิคอิเล็กโตรโฟเรซิสโดยใช้เอ็นไซม์ 9 ชนิด ซึ่งมีเอ็นคิวมทั้งสิ้น 20 โลไซ พบว่ามี 8 โลไซ ที่เป็นโพลิมอร์ฟิก สายพันธุ์พาณิชย์มีค่า genetic distance น้อยกว่าสายพันธุ์จากสถานีของรัฐ โดยค่าเฉลี่ย genetic distance ของสายพันธุ์จากสถานีของรัฐมีค่าเท่ากับ 0.0513 ส่วนสายพันธุ์พาณิชย์มีค่าเท่ากับ 0.0165

Creech (1991) ศึกษาปลา *Atherina boyeri* และ *A. presbyter* ด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟเรซิส พบว่าต่างชนิดกัน ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาก่อนหน้านี้ โดยใช้เอ็นไซม์ 11 เอ็นไซม์และ general protein ทดสอบกับกล้ามเนื้อและตับ ผลปรากฏว่ามี 8 เอ็นไซม์ที่มีสภาพเป็นโพลิมอร์ฟิก โดยมีเอ็นคิวมทั้งหมด 16 โลไซ 40 อัลลีล โลกัสที่สามารถใช้จำแนกประชากรได้คือ โลกัส EST-3 และ โลกัส G3PDH ส่วนที่ตำแหน่งโลกัส PGM จะมีลักษณะที่เหมือนกันทั้ง 2 ชนิด เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา Nei's genetic distance (D) ระหว่างกลุ่มประชากรของปลา *A. boyeri* และ *A. presbyter* ได้เท่ากับ 0.42 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปลาทั้ง 2 ชนิดนี้มีพันธุกรรมที่ไม่ชิดกัน

Teugels และคณะ (1992) ศึกษาปลา African clariid catfish จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ *Clarias anguillaris*, *C. ebriensis*, *C. gariepinus* และ *Heterobranchus longifilis* อวัยวะที่ใช้ศึกษาคือกล้ามเนื้อและตับ ใช้เอ็นไซม์ 10 เอ็นไซม์ คือ AAT, CK, FH, GPI, IDHP, LDH, MDH, PGDH, PGM และ SOD ปรากฏว่าปลา *C. anguillaris* และปลา *C. gariepinus* มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมากกว่าปลา *C. ebriensis* ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลทางสัณฐาน รูปแบบเอ็นไซม์ PGM ของปลา *H. longifilis* คือ PGM-85 ส่วนรูปแบบเอ็นไซม์ PGM ของปลา *C.*

gariepinus คือ PGM-100 และดูคุณสมบัติของทั้งสอง species มีรูปแบบเอ็นไซม์ PGM เป็น PGM 85/100 คือมีลักษณะร่วมของทั้งสองชนิด และเมื่อวิเคราะห์ค่าระยะห่างทางพันธุกรรมของปลา *C. ebriensis* เปรียบเทียบกับอีก 3 ชนิด พบว่ามีค่าถึง 0.75 ซึ่งแสดงว่าปลา *C. ebriensis* มีความแตกต่างทางพันธุกรรมจากปลาชนิดอื่นอย่างมาก

4. อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ

4.1 สัตว์ทดลอง

ปลาที่ใช้ในการศึกษาคือ ปลาสลิด (*Trichogaster pectoralis*, Regan 1910) ซึ่งเก็บรวบรวมจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง ได้แก่ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการ ฟาร์มปลาสลิดในจังหวัดพิษณุโลก ฟาร์มปลาสลิดในจังหวัดสุพรรณบุรี สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี และป่าพรุจังหวัดปัตตานี (ภาพที่ 1) จังหวัดละ 50 ตัว ปลา มีขนาดประมาณ 9.8-17.4 เซนติเมตร จัดเก็บรักษาตัวอย่าง แยกเป็นส่วนของอวัยวะกล้ามเนื้อ หัวใจ ตับ ไตและเลือด เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -70 ถึง -80 องศาเซลเซียส

4.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง

4.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง ได้แก่

- 1) น้ำแข็งแห้ง (dry ice)
- 2) ยาสลบ (quinadine)

4.2.2 สารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

- 1) สารละลายบัฟเฟอร์ Tris-EDTA -Borate
- 2) สารละลายบัฟเฟอร์ Tris citrate

ส่วนประกอบของสารเคมีที่ใช้เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์แสดงรายละเอียดใน

ภาคผนวก

4.2.3 ไอโซไซม์ที่ใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่

- 1) Aspartate amino transferases (AAT) ; E.C. 2.6.1.1
- 2) Adenylate kinase (AK) ; E.C. 2.7.4.3
- 3) Esterase (EST) ; E.C. 3.1.1.1
- 4) Fumarate hydratase (FUM) ; E.C. 4.2.1.2
- 5) Glucose dehydrogenase (GCDH) ; E.C. 1.1.1.47
- 6) Hexokinase (HK) ; E.C. 2.7.1.1

- 7) L – Iditol dehydrogenase (IDDH) ; E.C. 1.1.1.44
- 8) Malate dehydrogenase (MDH) ‘ E.C. 1.1.1.37
- 9) Malic enzyme (ME) ; E.C. 1.1.1.40
- 10) Mannose-6-phosphate isomerase (MPI) ; E.C. 5.3.1.8
- 11) Glucosephosphate isomerase (GPI) ; E.C. 5.3.1.9
- 12) Phosphogluconate dehydrogenase (PGDH) ; E.C. 1.1.1.14
- 13) Phosphoglucomutase (PGM) ; E.C. 5.4.2.2
- 14) Pyruvate kinase (PK) ; E.C. 2.7.1.40

ส่วนประกอบของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมสีย้อมของแต่ละไอโซไซม์แสดงไว้ในภาคผนวก


4.2.4 สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมสตาชเจล (Starch gel) ได้แก่

- 1) Hydrolysed starch
- 2) สารละลายบัฟเฟอร์ Tris-EDTA-Borate และ Tris citrate

4.2.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ไอโซไซม์ด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟเรซิส ได้แก่ อ่างบัฟเฟอร์ (buffer chamber) เครื่องจ่ายไฟ (power supply) homogenizer ผ้าขนหนูชนิดบาง แผ่นพลาสติก กระดาษกรอง ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิขณะทำอิเล็กโตรโฟเรซิส เครื่องแก้ว กรรไกรผ่าตัด มีดผ่าตัด เครื่องชั่ง ตะเกียงบนเส้น เครื่องดูดอากาศ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (-70 หรือ -80 องศาเซลเซียส)

4) การบรรจุตัวอย่าง

ภาคที่ 6.A



ภาพที่ 1 แผนที่แสดงสถานที่เก็บตัวอย่างปลาสดจำนวน 5 แห่ง

4.3 วิธีการ

แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง คือ

การทดลองที่ 1

การศึกษาหาไอโซไซม์ ชนิดของบัฟเฟอร์และอวัยวะที่เหมาะสมในการตรวจสอบประชากรปลาสด

มีขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้

1) การเก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างปลาสดจากจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 30 ตัวอย่างมาศึกษาหาไอโซไซม์ บัฟเฟอร์และอวัยวะที่เหมาะสมในการตรวจสอบประชากรปลาสด จัดเก็บตัวอย่างแยกเป็นส่วนของอวัยวะต่างๆ คือ กล้ามเนื้อ หัวใจ ตับ ไตและเลือด เก็บใส่หลอดพลาสติกขนาด 1.5 มิลลิลิตร และแช่แข็งอย่างรวดเร็วในน้ำแข็งแห้งที่อุณหภูมิ -76 องศาเซลเซียส เก็บรักษาตัวอย่างในตู้แช่แข็งอุณหภูมิประมาณ -70 ถึง -80 องศาเซลเซียส

2) การเตรียมเนื้อเยื่อ

นำตัวอย่างที่แช่แข็งไว้มาละลายในอุณหภูมิห้อง ใส่สารละลายบัฟเฟอร์ Tris-HCl pH 7.0 ปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวอย่าง รักษาเนื้อเยื่อให้อยู่ในอุณหภูมิต่ำไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเอนไซม์ บดเนื้อเยื่อด้วยแท่งแก้วก่อนนำไปปั่นให้ตกตะกอน ที่ 2,750 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที ตามวิธีการเตรียมตัวอย่างของ Pastures และคณะ (1988)

3) การเตรียมสตาซเจล

ซังแบ่งที่ hydrolysed (Sigma Chemical Co., St. Louis, Mo, USA) ในขวดรูปชมพู่ที่มีท่อสำหรับดูดอากาศออกน้ำหนัก 31.0 กรัม ใส่สารละลายบัฟเฟอร์ปริมาตร 310 มิลลิลิตร ละลายให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว ต้มแบ่งให้สุกด้วยความร้อนโดยใช้ตะเกียงบุนเส้น เขย่าสารละลายให้เข้ากันตลอดเวลาที่ให้ความร้อนเพื่อแบ่งจะไม่จับเป็นก้อนจนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนจากขุ่นเป็นใส ดูดอากาศในเจล ออกด้วยเครื่องดูดสูญญากาศจนหมด นำสารละลายเจลเทลงบนกรอบพลาสติกที่วางบนแผ่นกระจกเรียบโดยไม่ให้เกิดฟองอากาศ นำแผ่นกระจกหน้าเรียบขนาดเท่ากันมาปิดทับบนเจลอีกครั้ง ปลอ่ยให้เย็นโดยทิ้งไว้ข้ามคืน ก่อนที่จะบรรจุตัวอย่างลงบนแผ่นเจลเพื่อทำอิเล็กโตรโฟเรซิส ให้แผ่นเจลไปแช่ในตู้เย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 – 60 นาที ตามวิธีการเตรียมสตาซเจลของ Whitmore (1990) และ Macaranas (1991)

สารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้ ได้แก่ Tris-EDTA-Borate pH 8.0 และ pH 8.3 และ Tris Citrate pH 7.0 และ pH 8.0

4) การบรรจุตัวอย่าง

นำเจลที่แช่ไว้ในตู้เย็นออกจากกรอบพลาสติก ชั้ผิวหน้าเจลให้แห้งทั้งสองด้าน ตัดเจลออกเป็นสองส่วน โดยให้ส่วนที่มีขนาดใหญ่เป็นขั้วบวก ส่วนที่มีขนาดเล็กเป็นขั้วลบ แยกเจลทั้งสองส่วนให้ห่างกันเล็กน้อยเพื่อบรรจุกระดาษกรองที่ดูดซึมด้วยสารละลายตัวอย่างที่เตรียมไว้ในข้อ 2) ให้ปลายข้างหนึ่งของกระดาษจรดกับแผ่นกระจกด้านล่างของแผ่นเจล ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งให้พันขอบหน้าเจล โดยหนึ่งแผ่นเจลบรรจุกระดาษตัวอย่างครั้งละ 30 ตัวอย่าง แล้วนำชิ้นแผ่นเจลทั้งสองส่วนประกบให้ติดกันเหมือนเดิม

5) การเตรียมอ่างบัฟเฟอร์

นำอ่างบัฟเฟอร์มาใส่บัฟเฟอร์ชนิดเดียวกันกับที่ใช้เตรียมเจลในข้อ 3) ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ นำผ้าที่ชุ่มไปด้วยบัฟเฟอร์วางไว้ทั้งสองข้าง ๑ ละครึ่งผืน โดยให้ปลายข้างหนึ่งวางอยู่บนขอบเจลประมาณ 1 เซนติเมตร ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งแช่ในสารละลายบัฟเฟอร์ในอ่างบัฟเฟอร์

6) การทำอิเล็กโตรโฟรีซิส

นำอ่างบัฟเฟอร์ที่เตรียมไว้จากข้อ 5) มาต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟ โดยด้านขั้วบวกและขั้วลบของเจลต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟ ให้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวอย่างบนเจลโดยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ 5 องศาเซลเซียส ในตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันสภาพของไอโซไซม์ ตั้งเวลาการทำงานเครื่องควบคุมไว้ที่ 300 โวลท์ ครึ่งชั่วโมงแรกนำกระดาษตัวอย่างออกจากแผ่นเจลแล้วเพิ่มกระแสไฟให้คงที่ที่ 70 มิลลิแอมแปร์

7) การตัดแผ่นเจล

นำแผ่นเจลที่ผ่านการทำอิเล็กโตรโฟรีซิสจากข้อ 6) มาตัดออกเป็นแผ่นบาง ๆ จำนวน 3-4 แผ่น วางแผ่นเจลในถาดย้อมพลาสติกถาดละ 1 แผ่น เพื่อรอการย้อมหาไอโซไซม์ต่อไป

8) การย้อมหาไอโซไซม์

เตรียมสารเคมีที่ต้องการย้อมเพื่อตรวจสอบตำแหน่งปรากฏของไอโซไซม์ (แสดงไว้ในภาคผนวก) ไอโซไซม์ที่ใช้ได้แก่ Aspartate amino transferases, Adenylate kinase, Esterase, Fumarate hydratase, Glucose dehydrogenase, Hexokinase, L-Iditol dehydrogenase, Malate dehydrogenase, Malic enzyme, Mannose-6-phosphate isomerase, Glucosephosphate isomerase, Phosphogluconate dehydrogenase, Phosphoglucomutase, Pyruvate kinase นำสีย้อมไอโซไซม์แต่ละชนิดมาเทให้ท่วมแผ่นเจลที่เตรียมไว้ นำไปอบในตู้อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

9) การบันทึกข้อมูล

นำแผ่นเจลที่ขึ้นแถบตำแหน่งของไอโซไซม์มาบันทึกข้อมูล โดยวัดระยะห่างจากแถบที่ปรากฏระหว่างจุดที่บรรจุตัวอย่างกับจุดที่เกิดแถบ จดบันทึกชนิดอวัยวะ ไอโซไซม์ และบัฟเฟอร์ที่ทำการศึกษา

การทดลองที่ 2

ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

มีขั้นตอนการทดลองดังต่อไปนี้

1) ขั้นตอนการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 แต่ตัวอย่างปลาสดรวบรวมจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี พิษณุโลก อุบลราชธานีและปัตตานี แหล่งละ 50 ตัว โดยใช้อวัยวะ ชนิดของบัพเฟอร์ และสารเคมีที่ตรวจสอบไอโซไซม์ที่เหมาะสมซึ่งได้จากผลการทดลองที่ 1 มาศึกษา

2) การกำหนดสัญลักษณ์ของอัลลีลต่างๆ ใช้ตำแหน่งของแถบที่เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นตำแหน่งมาตรฐาน วัดระยะจากแถบบังกล่าวจนถึงจุดเริ่มต้น (จุดที่บรรจุตัวอย่าง) แล้วเทียบให้เท่ากับ 100 ส่วนตำแหน่งของแถบอื่นๆ ให้วัดระยะแล้วเทียบอัตราส่วนจากแถบมาตรฐาน ซึ่งถ้าแถบนี้อยู่ไกลจากจุดบรรจุตัวอย่างมากกว่าแถบมาตรฐาน ก็จะมีค่ามากกว่า 100 และถ้าแถบนี้อยู่ใกล้จุดบรรจุตัวอย่างมากกว่าแถบมาตรฐานก็จะมีค่าน้อยกว่า 100

3) การหาความถี่อัลลีล (Allele frequency) นับจำนวนตัวอย่างที่เกิดแถบใดๆ แล้วนำมาคำนวณโดยใช้สูตร

$$\text{ความถี่อัลลีล} = (2 H_o + H_h) / 2N$$

H_o คือจำนวนตัวอย่างที่มีอยู่ในสภาพโฮโมไซกัส (Homozygous)

H_h คือจำนวนตัวอย่างที่มีอยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส (Heterozygous)

N คือจำนวนตัวอย่างที่นำมาศึกษาที่ไอโซไซม์นั้นๆ

4) นำค่าความถี่อัลลีลที่ไล่ต่างๆ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์หาค่าทางพันธุกรรม (Genetic values) เช่น ค่าเฮเทอโรไซโกซิตี ค่า genetic identity ค่า genetic similarity ค่า genetic distance และวิเคราะห์ cluster analysis โดยใช้โปรแกรม Biosys-1 (Swofford, 1989)

การทดลองที่ 3

ศึกษาลักษณะภายนอกของปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง


ลักษณะภายนอกที่ศึกษาได้แก่ ความยาวลำตัวมาตรฐาน ความยาวส่วนหัว จำนวนลายขวาง ลำตัว จำนวนก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อนของครีบหลัง ครีบกัน และครีบหาง จำนวนเกล็ดบนเส้นข้างลำตัว (ภาพที่ 2) โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ for Windows version 6 (ธวัชชัย, 2537) วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติจากค่าอัตราส่วนความยาวหัวต่อความยาวลำตัวมาตรฐาน

4.4 สถานที่ทำการทดลอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ จังหวัดปทุมธานี

4.5 ระยะเวลาทำการทดลอง

เริ่มทำการทดลองเดือนมกราคม พ.ศ. 2537 และสิ้นสุดการทดลองเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540



ภาพที่ 2 ลักษณะภายนอกของปลาสดที่ทำการศึกษา

5. ผลการศึกษา

การทดลองที่ 1

ศึกษาหาไอโซไซม์ ชนิดของบัฟเฟอร์ และอวัยวะที่เหมาะสมในการตรวจสอบประชากรปลาสด

จากการศึกษาหาปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบไอโซไซม์ของปลาสด โดยใช้กล้ามเนื้อ ตับ ไต เลือดและหัวใจเป็นอวัยวะทดสอบและใช้สารละลายบัฟเฟอร์ Tris-citrate (CTC) pH 7.0 และ pH 8.0 และ Tris-EDTA-borate (TEB) pH 8.0 และ pH 8.3 ทดสอบการปรากฏแถบของไอโซไซม์ 14 ชนิด ซึ่งได้ผลดังต่อไปนี้

ไอโซไซม์ Aspartate amino transferases (AAT) ไม่ปรากฏแถบของไอโซไซม์ ที่อวัยวะใด ๆ

ไอโซไซม์ Adenylate kinase (AK) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้กล้ามเนื้อในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 8.0 มีเอนไซม์ควบคุมการสร้างไอโซไซม์อยู่ 2 โกลีไซม์ ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลของไอโซไซม์เป็นโมโนเมอร์ (monomer)

ไอโซไซม์ Esterase (EST) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้กล้ามเนื้อในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB pH 8.3 และ CTC pH 8.0 เมื่อใช้ตับในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 7.0 และ pH 8.0 เมื่อใช้ไตในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB pH 8.3 และ CTC pH 8.0 ในกล้ามเนื้อ ไตและหัวใจ มีเอนไซม์ที่ควบคุมการสร้างไอโซไซม์นี้ 1 โกลีไซม์ ส่วนตับมีเอนไซม์ควบคุมอยู่ 3 โกลีไซม์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบโมโนเมอร์

ไอโซไซม์ Fumarate hydratase (FUM) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้ตับเป็นอวัยวะทดสอบในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 8.0 และเลือดปรากฏแถบชัดเจนในทุกสารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้ทดสอบ เอนไซม์ที่ควบคุมมี 2 โกลีไซม์ มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นเตตระเมอร์ (tetramer)

ไอโซไซม์ Glucose dehydrogenase (GCDH) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้ตับเป็นอวัยวะทดสอบในทุกสารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้ทดสอบ ยกเว้น CTC pH 7.0 เอนไซม์ที่ควบคุมการสร้างไอโซไซม์ มี 2 โกลีไซม์ ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโมโนเมอร์

ไอโซไซม์ Glucosephosphate isomerase (GPI) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนในทุกอวัยวะและทุกสารละลายบัฟเฟอร์ มีเอนไซม์ที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์เพียง 1 โกลีไซม์ โดยมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นไดเมอร์ (dimer)

ไอโซไซม์ Hexokinase (HK) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้ตับเป็นอวัยวะทดสอบในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 7.0 และ pH 8.0 และใน TEB pH 8.3 ไอโซไซม์นี้มีเอนไซม์ควบคุม 1 โกลีไซม์ มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโมโนเมอร์

ไอโซไซม์ L-Iditol dehydrogenase (IDDH) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้ตับเป็นอวัยวะทดสอบในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 8.0 และ TEB pH 8.0 และเมื่อใช้ไตในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 7.0 ไอโซไซม์นี้มีน้ำหนัก 2 โกลี มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นเตตระเมอร์

ไอโซไซม์ Malate dehydrogenase (MDH) จะปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะทดสอบในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 8.0 และ TEB pH 8.3 เมื่อใช้ตับในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 8.0 เมื่อใช้ไตในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 7.0 และ pH 8.0 เมื่อใช้เลือดในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 8.0 และเมื่อใช้หัวใจในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 7.0 และ CTC pH 8.0 ไอโซไซม์นี้มีน้ำหนัก 1 โกลี และมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นไดเมอร์

ไอโซไซม์ Malic enzyme (ME) จะปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้กล้ามเนื้อ ตับ และไตเป็นอวัยวะทดสอบในทุกสารละลายบัฟเฟอร์ และเมื่อใช้เลือดในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB pH 8.0 ไอโซไซม์นี้มีน้ำหนัก 1 โกลี และมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโมโนเมอร์

ไอโซไซม์ Mannose-6-phosphate isomerase (MPI) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะทดสอบในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB pH 8.3 และเมื่อใช้เลือดเป็นอวัยวะทดสอบในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB pH 8.0 ไอโซไซม์นี้ควบคุมด้วยอินซูลิน 2 โกลี และมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นไดเมอร์

ไอโซไซม์ Phosphoglucosmutase (PGM) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้ตับ ไต เลือด และหัวใจในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH และ 8.0 และเมื่อใช้กล้ามเนื้อในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB pH 8.0 และ pH 8.3 ไอโซไซม์นี้มีน้ำหนัก 1 โกลี และมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโมโนเมอร์

ไอโซไซม์ Pyruvate kinase (PK) ปรากฏแถบไอโซไซม์ชัดเจนเมื่อใช้ตับและไตเป็นอวัยวะทดสอบในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 7.0 และ pH 8.0 มีน้ำหนักการสร้างไอโซไซม์ 1 โกลี มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นเตตระเมอร์

สรุปผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1 โดยกำหนดนิยามว่า

ปรากฏแถบของไอโซไซม์ชัดเจน	ใช้สัญลักษณ์ (+)
ปรากฏแถบของไอโซไซม์ไม่ชัดเจน	ใช้สัญลักษณ์ (-)
ไม่ปรากฏแถบของไอโซไซม์	ใช้สัญลักษณ์ (0)

นำผลการทดลองที่ 1 มาเลือกชนิดของอวัยวะ ชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์และไอโซไซม์ที่เหมาะสมในการตรวจสอบไอโซไซม์ เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่งในการทดลองที่ 2 ผลการศึกษาจากการทดลองที่ 1 ซึ่งจะนำมาใช้ในการทดลองที่ 2 สรุปไว้ในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาหาไอโซไซม์ ชนิดของบัฟเฟอร์ และอวัยวะที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
ประชากรปลาสด

เอนไซม์	กล้ามเนื้อ				ตับ				ไต				เลือด				หัวใจ			
	TC		TEB		TC		TEB		TC		TEB		TC		TEB		TC		TEB	
	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH
	7.0	8.0	8.0	8.3	7.0	8.0	8.0	8.3	7.0	8.0	8.0	8.3	7.0	8.0	8.0	8.3	7.0	8.0	8.0	8.3
AAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AK	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EST	-	+	-	+	+	+	0	-	-	+	+	+	0	0	0	+	-	+	-	+
FUM	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0
GCDH	0	0	0	0	-	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GPI	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	+	+	+	+
HK	0	0	0	0	-	+	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDDH	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MDH	0	+	0	-	0	+	0	0	+	-	0	0	0	-	+	0	-	-	0	0
ME	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	+	-	0	0	0	0
MPI	0	0	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	0	0	0	-	-
PGDH	0	0	0	0	-	+	0	0	-	+	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0
PGM	0	0	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	0	0	-	+	-	-
PK	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

เครื่องหมาย (+) : ผลปรากฏแถบชัดเจน
เครื่องหมาย (-) : ผลปรากฏแถบไม่ชัดเจน
เครื่องหมาย (0) : ผลไม่ปรากฏแถบ

ตารางที่ 2 สรุปแผนการทดลองเพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

เอนไซม์	อวัยวะ	บัฟเฟอร์	โลกส์ที่พบ
EST	กล้ามเนื้อ	CTC pH 8.0	EST-3
	ตับ	CTC pH 8.0	EST-1,EST-2,EST-3
	หัวใจ	CTC pH 8.0	EST-2
	หัวใจ	TEB pH 8.3	EST-2
ME	กล้ามเนื้อ	TEB pH 8.3	ME
	หัวใจ	CTC pH 8.0	ME
AK	ตับ	CTC pH 8.0	AK-1, AK-2
	ไต	CTC pH 8.0	AK-2
PGDH	ตับ	CTC pH 8.0	PGDH-1, PGHD-2
	ไต	CTC pH 8.0	PGDH-2
PGI	ไต	TEB pH 8.3	PGI
PGM	ไต	TEB pH 8.3	PGM
	หัวใจ	CTC pH 8.0	PGM

จัดทำโดยกรมประมง

การทดลองที่ 2

ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสร้อยจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

1. รูปแบบของแถบไอโซไซม์ (Isozyme pattern)

จากการศึกษาไอโซไซม์ชนิดต่างๆ เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสร้อยที่รวบรวมจากแหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการ พิชณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานีและปัตตานี แถบตำแหน่งของไอโซไซม์ที่ปรากฏมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของไอโซไซม์ ชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์และอวัยวะที่ใช้ แถบของไอโซไซม์ที่ให้ผลชัดเจนและสามารถบันทึกผลได้มีทั้งหมด 17 โลไซ โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังต่อไปนี้


Adenylate kinase (AK)

เมื่อใช้ตับเป็นอวัยวะทดสอบ พบว่ามียีนควบคุม 2 โลไซ โดยโลกัส AK-1 มี 4 อัลลีล ส่วนโลกัส AK-2 มี 2 อัลลีล ตัวอย่างที่ทดสอบนั้นมีทั้งที่เป็นโฮโมไซโกต (homozygote) และเฮเทอโรไซโกต (heterozygote) ทั้ง 2 โลไซเป็นโพลิมอร์ฟิกโลไซ (polymorphic loci) ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3(a) ในตับพบว่าที่ตำแหน่ง AK-1 ประชากรปลาสร้อยจากอุบลราชธานีมี 4 อัลลีล ขณะที่ประชากรจากแหล่งอื่นมีเพียง 3 อัลลีล ที่ตำแหน่ง AK-2 ประชากรจากปัตตานีมี 3 อัลลีล ส่วนที่ประชากรจากแหล่งอื่นมี 2 อัลลีล โดยทั้ง 2 โลไซนี้เป็นโพลิมอร์ฟิกโลไซ และเมื่อใช้ไตเป็นอวัยวะทดสอบ พบว่ามียีนควบคุมเพียง 1 โลกัส ซึ่งมี 2 อัลลีล ยีนที่ควบคุมมีสภาพเป็นโพลิมอร์ฟิกโลกัสดังแสดงในภาพที่ 3(b) ในไตจะพบโลกัสเดียวมี 2 อัลลีล โดยประชากรจากสมุทรปราการเป็นเฮเทอโรไซโกตทั้งหมดและมีสภาพเป็นโมโนเมอร์ฟิกโลไซ แสดงว่าไอโซไซม์ AK นี้มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโมโนเมอร์ เนื่องจากตัวอย่างที่เป็นเฮเทอโรไซโกตจะปรากฏแถบไอโซไซม์ให้เห็นเป็น 2 แถบ และตัวอย่างที่เป็นโฮโมไซโกตจะปรากฏแถบไอโซไซม์ให้เห็นเพียงแถบเดียว


Esterase (EST)

เมื่อใช้กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะทดสอบ ปรากฏแถบไอโซไซม์ที่ควบคุมโดยมียีนเพียง 1 โลกัสซึ่งมี 2 อัลลีล (ภาพที่ 4a) ตัวอย่างที่ศึกษามียีนดังกล่าวอยู่ในสภาพทั้งที่เป็นโฮโมไซโกตและเฮเทอโรไซโกต เมื่อใช้ตับทดสอบพบว่ามียีนควบคุม 3 โลไซคือ EST-1, EST-2 และ EST-3 โดยโลกัส EST-1 และ EST-2 มี 3 อัลลีล ส่วน EST-3 มี 2 อัลลีล (ภาพที่ 4b) ยีนทั้ง 3 โลไซของตัวอย่างจากจังหวัดพิษณุโลกมีสภาพเป็นโฮโมไซกัสทั้งหมด ขณะที่ตัวอย่างจากอุบลราชธานีและสมุทรปราการมียีนที่โลกัส EST-1 เท่านั้นที่มีสภาพเป็นโฮโมไซกัส และตัวอย่างจากจังหวัดปัตตานีมียีนที่โลกัส EST-2 และ EST-3 มีสภาพเป็นโฮโมไซกัส

ภาพที่ 2




ภาพที่ 3 รูปแบบไอโซไซม์ AK ของไต (a) และตับ (b) ปลาสลิด




ภาพที่ 4 รูปแบบไอโซไซม์ของกล้ามเนื้อ (a) และตับ (b) ปลาสลิด

2. ค่าความพันธุกรรม (Genetic values)


เมื่อทำการบันทึกแถบไอโซไซม์มาวิเคราะห์หาความถี่ยีนต่อตำแหน่งยีน (2Ho+He) / 2N จะมีความสัมพันธ์ของไอโซไซม์ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3




ภาพที่ 5 รูปแบบไอโซไซม์ ME ของกล้ามเนื้อ (a) และหัวใจ (b) ปลาสลิด



ภาพที่ 6 รูปแบบไอโซไซม์ PGDH ของตับ (a) และไต (b) ปลาสลิด



ภาพที่ 7 รูปแบบไอโซไซม์ PGI ของไตปลาสด



ภาพที่ 8 รูปแบบไอโซไซม์ PGM ของไตปลาสด

2. ค่าทางพันธุกรรม (Genetic values)

เมื่อนำผลการบันทึกแถบไอโซไซม์มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ยัลลีลตามสูตร $(2H_o + H_e) / 2N$ จะได้ค่าความถี่ยัลลีลของโลไซต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3

3. ค่าความแปรปรวนทางพันธุกรรม (Genetic variability)

ค่าเฮเทอโรไซโกซิตี (heterozygosity) ณ ยีนตำแหน่งต่างๆ ของปลาสดในแต่ละประชากร แสดงไว้ในตารางที่ 4 โดยมีค่าตั้งแต่ 0.0-0.505 ปลาสดจากอุบลราชธานีที่ตำแหน่งโลกัส AK-1 มีค่าเฮเทอโรไซโกซิตีสูงสุดเท่ากับ 0.567 ปลาสดจากทุกประชากรมีค่าเฮเทอโรไซโกซิตีที่ตำแหน่งโลกัส PGDH-2 เท่ากับ 0.0 ประชากรจากพิษณุโลกมีค่าเฮเทอโรไซโกซิตี EST-1, EST-2 และ EST-3 เท่ากับ 0.0 ทั้ง 3 โลไซ ส่วนประชากรจากปัตตานีมีค่าเฮเทอโรไซโกซิตี ที่โลกัส EST-2 และ EST-3 เท่ากับ 0.0 ประชากรจากสมุทรปราการและอุบลราชธานีมีค่าเฮเทอโรไซโกซิตี ที่โลกัส EST-1 เท่ากับ 0.0 ประชากรจากพิษณุโลกและสุพรรณบุรีมีค่าเฮเทอโรไซโกซิตี ที่โลกัส PGDH เท่ากับ 0.0 เมื่อใช้หัวใจเป็นอวัยวะทดสอบตัวอย่างประชากรจากปัตตานีมีค่าเฮเทอโรไซโกซิตี ที่โลกัส EST เท่ากับ 0.0 เมื่อใช้หัวใจเป็นอวัยวะทดสอบพบว่าประชากรจากสมุทรปราการพิษณุโลกและสุพรรณบุรีต่างก็มีค่าเฮเทอโรไซโกซิตีเท่ากับ 0.0 ค่าเฮเทอโรไซโกซิตี ที่โลกัส PGM โดยเฉลี่ยต่อโลกัสมีค่าอยู่ในช่วง 0.178-0.238 โดยประชากรจากปัตตานีมีค่าเฮเทอโรไซโกซิตีเฉลี่ยต่อโลกัสต่ำสุดเท่ากับ 0.178 และประชากรจากจังหวัดอุบลราชธานีมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.238 (ตารางที่ 5)

เมื่อนำค่าความถี่ยัลลีลของแต่ละโลกัสจากทุกประชากรมาคิดค่าไคมีสแควร์ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 6-10 จากการตั้งสมมติฐานว่าประชากรปลาสดจาก 5 แหล่งน้ำอยู่ในสมดุลย์ประชากร ซึ่งเมื่อนำมาคิดค่าไคมีสแควร์แล้วพบว่า ประชากรปลาสดจากจังหวัดสมุทรปราการ พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานีและปัตตานีมีค่าไคมีสแควร์เท่ากับ 420.437, 263.286, 277.976, 373.099 และ 231.981 ตามลำดับ

4. ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (Evolutionary relationships)

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ genetic identity และ genetic distance ตามวิธีการของ Nei (1978) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 11 ประชากรปลาสดจากสมุทรปราการและพิษณุโลกมีค่า genetic identity เท่ากับ 0.985 ซึ่งเป็นค่าสูงสุด ส่วนประชากรจากพิษณุโลกและปัตตานีมีค่า genetic identity ต่ำสุดเท่ากับ 0.933 ค่า genetic distance ระหว่างประชากรจากพิษณุโลกและปัตตานีมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.080 และค่า genetic distance ระหว่างประชากรจากสมุทรปราการและสุพรรณบุรีมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.028

5. Cluster analysis

เมื่อนำค่าสัมประสิทธิ์จาก Nei (1978) unbiased genetic identity มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยใช้วิธีการ cluster analysis ผลที่ได้คือระหว่างประชากรจากสมุทรปราการกับพิษณุโลกมีค่า clustering level อยู่ในระดับสูงสุดเท่ากับ 0.985 เมื่อนำประชากรจากสุพรรณบุรีเปรียบเทียบกับประชากรจากสมุทรปราการและพิษณุโลกพบว่ามีค่า clustering level เท่ากันคือเท่ากับ 0.972 ส่วนประชากรจากอุบลราชธานีเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรจากสมุทรปราการ พิษณุโลกและสุพรรณบุรีมีค่า clustering level เท่ากันคือ 0.952 และประชากรจากปัตตานีเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรจากสมุทรปราการ พิษณุโลก สุพรรณบุรี และอุบลราชธานีได้ค่า clustering level เท่ากันคือเท่ากับ 0.931 รูปแบบความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการแสดงไว้ในภาพที่ 9

ตารางที่ 3 ค่าความถี่อัลลีลของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

		แหล่งน้ำในจังหวัด					
โลกัส	อัลลีล	สมุทรปราการ	พิษณุโลก	สุพรรณบุรี	อุบลราชธานี	ปัตตานี	
ME (CTC pH 8.0) M	113	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	
	100	0.850	0.860	0.840	0.800	0.840	
	75	0.150	0.140	0.160	0.160	0.160	
EST-3 (CTC pH 8.0) M	120	0.090	0.150	0.050	0.130	0.050	
	100	0.910	0.850	0.950	0.870	0.950	
AK-1 (CTC pH 8.0) L	121	0.110	0.000	0.200	0.600	0.140	
	107	0.000	0.850	0.000	0.020	0.000	
	100	0.890	0.050	0.800	0.180	0.860	
	86	0.000	0.100	0.000	0.200	0.000	
AK-2 (CTC pH 8.0) L	117	0.100	0.120	0.100	0.020	0.100	
	100	0.900	0.880	0.900	0.980	0.900	
PGDH-1 (CTC pH 8.0) L	102	0.020	0.180	0.100	0.000	0.000	
	100	0.880	0.820	0.900	0.880	0.180	
	98	0.100	0.000	0.000	0.120	0.820	
PGDH-2 (CTC pH 8.0) L	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
EST-1 (CTC pH 8.0) L	102	0.000	0.000	0.090	0.000	0.000	
	100	1.000	1.000	0.910	1.000	0.910	
	95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.090	
EST-2 (CTC pH 8.0) L	104	0.040	0.000	0.080	0.090	0.000	
	100	0.910	1.000	0.920	0.910	1.000	
	96	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	
EST-3 (CTC pH 8.0) L	100	0.860	1.000	0.880	0.860	1.000	
	94	0.140	0.000	0.120	0.140	0.000	
AK-2 (CTC pH 8.0) L	200	0.500	0.400	0.090	0.160	0.050	
	100	0.500	0.600	0.910	0.840	0.950	
PGDH-2 (CTC pH 8.0) K	106	0.000	0.000	0.000	0.260	0.280	
	100	0.780	1.000	1.000	0.670	0.720	
	97	0.220	0.000	0.000	0.070	0.000	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

		แหล่งน้ำในจังหวัด					
โลกัส	อัลลิล	สมุทรปราการ	พิษณุโลก	สุพรรณบุรี	อุบลราชธานี	ปัตตานี	
PGI	100	0.880	0.530	0.860	0.850	0.860	
(TEB pH 8.3) K	44	0.120	0.470	0.140	0.150	0.140	
PGM	110	0.500	0.500	0.120	0.140	0.120	
(CTC pH 8.0) K	100	0.500	0.500	0.800	0.860	0.880	
ME	100	0.800	0.790	0.850	0.900	0.760	
	63	0.200	0.180	0.100	0.090	0.230	
	83	0.000	0.030	0.050	0.010	0.010	
EST-2	121	0.100	0.110	0.140	0.250	0.000	
	100	0.820	0.780	0.680	0.750	1.000	
	71	0.080	0.110	0.180	0.000	0.000	
EST-2	108	0.100	0.070	0.000	0.140	0.100	
	100	0.870	0.930	0.920	0.860	0.860	
	85	0.030	0.000	0.080	0.000	0.040	
PGM	121	0.000	0.000	0.000	0.100	0.100	
(TEB pH 8.3) H	100	1.000	1.000	1.000	0.900	0.900	
CTC pH 8.0 : บัฟเฟอร์ Tris-citrate pH 8.0							
TEB pH 8.3 : บัฟเฟอร์ Tris-EDTA-borate pH 8.3							
M	: กล้ามเนื้อ						
L	: ดับ						
K	: ไต						
H	: หัวใจ						

ตารางที่ 4 ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตี (unbiased heterozygosity) ทุกโลไโซของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

เฮตเทอโรไซโกซิตี (unbiased)					
โลไกส์	สมุทรปราการ	พิษณุโลก	สุพรรณบุรี	อุบลราชธานี	ปัตตานี
ME (CCT pH 8.0) M	0.255 (0.258)	0.241 (0.243)	0.269 (0.272)	0.333 (0.336)	0.269 (0.272)
EST-3 (CTC pH 8.0) M	0.164 (0.165)	0.255 (0.258)	0.095 (0.096)	0.226 (0.228)	0.095 (0.096)
AK-1 (CTC pH 8.0) L	0.196 (0.198)	0.265 (0.268)	0.320 (0.323)	0.567 (0.573)	0.241 (0.243)
AK-2 (CTC pH 8.0) L	0.180 (0.182)	0.295 (0.298)	0.180 (0.182)	0.039 (0.040)	0.180 (0.182)
PGDH-1 (CTC pH 8.0) L	0.215 (0.217)	0.295 (0.298)	0.180 (0.182)	0.211 (0.213)	0.295 (0.298)
PGDH-2 (CTC pH 8.0) L	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
EST-1 (CTC pH 8.0) L	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.164 (0.165)	0.000 (0.000)	0.164 (0.165)
EST-2 (CTC pH 8.0) L	0.168 (0.169)	0.000 (0.000)	0.147 (0.149)	0.164 (0.165)	0.000 (0.000)
EST-3 (CTC pH 8.0) L	0.241 (0.243)	0.000 (0.000)	0.211 (0.213)	0.241 (0.243)	0.000 (0.000)
AK-2 (CTC pH 8.0) K	0.500 (0.505)	0.480 (0.485)	0.164 (0.165)	0.269 (0.272)	0.095 (0.096)
PGDH-2 (CTC pH 8.0) K	0.343 (0.347)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.479 (0.483)	0.403 (0.407)
PGI (TEB pH 8.3) K	0.211 (0.213)	0.498 (0.503)	0.241 (0.243)	0.255 (0.258)	0.241 (0.243)
PGM (TEB pH 8.3) K	0.500 (0.505)	0.500 (0.505)	0.200 (0.213)	0.241 (0.243)	0.211 (0.213)
ME (TEB pH 8.3) K	0.320 (0.323)	0.343 (0.346)	0.265 (0.268)	0.182 (0.184)	0.369 (0.373)
EST-2 (CTC pH 8.0) H	0.311 (0.314)	0.367 (0.371)	0.486 (0.491)	0.375 (0.379)	0.000 (0.000)
EST-2 (TEB pH 8.3) H	0.232 (0.235)	0.130 (0.132)	0.147 (0.149)	0.241 (0.243)	0.249 (0.251)
PGM (CTC pH 8.0) H	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.180 (0.182)

ค่าตัวเลขในวงเล็บคือค่า unbiased heterozygosity

การคัดเลือกประชากรปลาเทโพ (unbiased heterozygosity) ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบ 4 ที่ยีน
 ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยเฮเทอโรไซโกซิตีต่อโลคัสของประชากรปลาเทโพจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

แหล่งน้ำในจังหวัด	Mean heterozygosity		Mean heterozygosity	
	Per locus (biased estimate)		Per locus (unbiased estimate)	
สมุทรปราการ	0.226	(0.036)	0.238	(0.036)
พิษณุโลก	0.214	(0.046)	0.216	(0.046)
สุพรรณบุรี	0.181	(0.030)	0.183	(0.030)
อุบลราชธานี	0.235	(0.036)	0.238	(0.037)
ปัตตานี	0.176	(0.031)	0.178	(0.031)
ค่าตัวเลขในวงเล็บคือค่า Standard error				

M : กล้ามเนื้อ
 L : ตับ
 K : ไต
 H : หัวใจ

ค่าเฉลี่ยเฮเทอโรไซโกซิตี (unbiased heterozygosity)

ตารางที่ 6

ค่าไคมีสแควร์ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการ

โดกัส	อัลลิล	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.
ME (CTC pH 8.0) M	113/113	35	36.125	1.557	2
	100/75	15	12.750		
	75/75	0	1.125		
EST-3 (CTC pH 8.0) M	120/120	0	0.405	0.489	2
	120/100	90	8.190		
	100/100	41	41.405		
AK-1 (CTC pH 8.0) L	121/121	3	0.605	11.970	2
	121/100	5	9.790		
	100/100	42	39.605		
AK-2 (CTC pH 8.0) L	117/117	6	0.500	69.802	2
	117/100	0	9.000		
	100/100	44	40.500		
PGDH-1 (CTC pH 8.0) L	102/102	0	0.020	50.568	5
	102/100	1	1.760		
	102/95	0	0.200		
	100/100	44	38.720		
	100/95	0	8.800		
PGDH-2 (CTC pH 8.0) L	95/95	5	0.500	0.000	2
	100/100	50	50.000		
EST-1 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50.000	0.000	
EST-2 (CTC pH 8.0) L	102/102	0	0.080	31.692	5
	102/100	5	3.640		
	102/95	0	0.200		
	100/100	42	41.405		
	100/95	1	4.550		
EST-3 (CTC pH 8.0) L	95/95	2	0.125	50.000	2
	100/100	29	16.820		
	100/94	0	24.360		
AK-2 (CTC pH 8.0) K	94/94	21	8.820	50.000	2
	200/200	0	12.500		
	200/100	50	25.000		
PGDH-2 (CTC pH 8.0) K	100/100	0	15.500	50.000	2
	100/97	0	17.160		
	97/97	11	2.420		

ตารางที่ 6 (ต่อ)

โล่กัศ	อัลลิล	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.	
PGI (TEM pH 8.3) K	100/100	38	38.72	0.929	2	
	100/44	12	10.560			
	44/44	0	0.720			
PGM (TEM pH 8.3) K	110/110	5	12.500	50.00	2	
	110/100	50	25.000			
	100/100	0	12.500			
ME (CTC pH 8.0) H	100/100	40	32.00	50.000	2	
	100/63	0	16.000			
	63/63	10	2.000			
EST-2(CTC pH 8.0) H	121/121	0	0.500	2.409	5	
	121/100	10	8.200			
	121/71	0	0.800			
	100/100	32	33.620			
	100/71	8	6.560			
	71/71	0	0.320			
EST-2 (TEB pH 8.3) H	108/108	0	0.500	1.521	5	
	108/100	10	8.700			
	108/85	0	0.300			
	100/100	37	37.845			
	100/85	3	2.610			
	85/85	0	0.450			
TOTAL				420.437**	37	P<0.01

CTC pH 8.0 : บัฟเฟอร์ Tris-citrate pH 8.0

TEB pH 8.3 : บัฟเฟอร์ Tris-EDTA-borate pH 8.3

M : กล้ามเนื้อ

L : ตับ

K : ไต

H : หัวใจ

ตารางที่ 7 ค่าไคเมร์สแควร์ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำในจังหวัดพิษณุโลก

โล่กัสด	อัลลิล	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.
ME (CTC pH 8.0) M	100/100	35	36.125		
	100/75	15	12.750		
	75/75	0	1.125	1.557	2
EST-3 (CTC pH 8.0) M	120/120	0	1.125		
	120/100	15	12.750		
	100/100	35	36.125	0.467	2
AK-1 (CTC pH 8.0) L	121/121	5	1.620		
	121/100	8	14.760		
	100/100	37	33.620	10.488	2
AK-2 (CTC pH 8.0) L	117/117	5	0.720		
	117/100	2	10.560		
	100/100	43	38.720	32.854	2
PGDH-1 (CTC pH 8.0) L	102/102	9	1.620		
	102/100	0	14.760		
	100/100	41	33.620	50.000	2
PGDH-2 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50.000	0.000	
EST-1 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50.000	0.000	
EST-2 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50.000	0.000	
EST-3 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50.000	0.000	2
AK-2 (CTC pH 8.0) K	200/200	0	8.000		
	200/100	40	24.000		
	100/100	10	18.000	22.223	2
PGDH-2 (CTC pH 8.0) K	100/100	50	50.000	0.000	
PGI (TEM pH 8.3) K	100/100	3	14.050		
	100/44	47	24.910		
	44/44	0	11.050	39.33	2
PGM (TEM pH 8.3) K	110/110	5	12.500		
	110/100	50	25.000		
	100/100	0	12.500	50.00	2
ME (CTC pH 8.0) K	100/100	38	31.205		
	100/63	0	14.220		
	100/38	9	1.620		
	63/63	0	0.540		
	63/38	3	2.370		
	38/38	0	0.045	50.072	5

ตารางที่ 7 (ต่อ)

โลกัศ	จัศลล	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.
EST-2(CTC pH 8.0) H	121/121	2	0.605		
	121/100	7	8.580		
	121/71	0	1.210		
	100/100	30	30.420		
	100/71	11	0.605		
	71/71	0	8.580	6.012	5
EST-2 (TEB pH 8.3) H	108/108	0	0.245		
	108/100	7	6.510		
	100/100	43	43.245	0.283	2
TOTAL				263.286**	26 P<0.01

CTC pH 8.0 : บัฟเฟอร์ Tris-citrate pH 8.0
TEB pH 8.3 : บัฟเฟอร์ Tris-EDTA-borate pH 8.3
M : กล้ามเนื้อ
L : ตับ
K : ไต
H : หัวใจ

ตารางที่ 8 ค่าไคมีสแควร์ของประชากรปลาผลิตจากแหล่งน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรี

โลโก้	อัลลีล	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.
ME (CTC pH 8.0) M	100/100	35	35.280	1.463	2
	100/75	15	13.440		
	75/75	0	1.280		
EST-3 (CTC pH 8.0) M	120/120	0	1.125	0.138	2
	120/100	5	47.500		
	100/100	45	45.125		
AK-1 (CTC pH 8.0) L	121/121	10	2.000	50.000	2
	121/100	0	16.000		
	100/100	40	32.000		
AK-2 (CTC pH 8.0) L	117/117	5	0.500	50.000	2
	117/100	0	9.000		
	100/100	45	40.500		
PGDH-1 (CTC pH 8.0) L	102/102	5	0.500	50.000	2
	102/100	0	9.000		
	100/100	45	40.500		
PGDH-2 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50.000	0.000	
EST-1 (CTC pH 8.0) L	102/102	0	0.045	0.129	2
	102/100	9	8.190		
	100/100	41	41.405		
EST-2 (CTC pH 8.0) L	104/104	2	0.320	10.420	2
	104/100	4	7.360		
	100/100	44	42.320		
EST-3 (CTC pH 8.0) L	100/100	40	38.720	2.939	2
	100/94	8	10.560		
	94/94	2	0.720		
AK-2 (CTC pH 8.0) K	200/200	0	0.410	0.494	2
	200/100	9	8.190		
	100/100	41	41.410		
PGDH-2 (CTC pH 8.0) K	100/100	50	50.000	0.000	
PGI (TEM pH 8.3) K	100/100	36	36.980	1.325	2
	100/44	14	12.040		
	44/44	0	0.480		
PGM (TEM pH 8.3) K	110/110	0	0.72	0.929	2
	110/100	12	10.56		
	100/100	38	38.72		

ตารางที่ 8 (ต่อ)

โล่กล	อัลลีล	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.
ME (CTC pH 8.0) K	100/100	40	36.125	50.173	5
	100/63	0	8.500		
	100/38	5	4.250		
	63/63	5	0.500		
	63/38	0	0.500		
	38/38	0	0.125		
EST-2(CTC pH 8.0) H	121/121	7	0.980	59.588	5
	121/100	0	9.520		
	121/71	0	2.520		
	100/100	30	23.12		
	100/71	8	12.240		
	71/71	5	1.620		
EST-2 (TEB pH 8.3) H	100/100	42	42.320	0.378	2
	100/85	8	7.360		
	85/85	0	0.320		
TOTAL				277.976**	34

CTC pH 8.0 : บัฟเฟอร์ Tris-citrate pH 8.0

TEB pH 8.3 : บัฟเฟอร์ Tris-EDTA-borate pH 8.3

M : กล้ามเนื้อ

L : ตับ

K : ไต

H : หัวใจ

ตารางที่ 9 ค่าไคมีสแควร์ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำในจังหวัดอุบลราชธานี

ล็อกส	อัลลีล	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.
ME (CTC pH 8.0) M	113/113	0	0.080	3.125	5
	113/100	4	3.200		
	113/75	0	0.640		
	100/100	30	32.000		
	100/75	16	12.800		
	75/75	0	1.280		
EST-3 (CTC pH 8.0) M	120/120	0	0.845	1.117	2
	120/100	13	11.310		
	100/100	37	37.845		
AK-1 (CTC pH 8.0) L0	121/121	29	18.000	147.000	9
	121/107	0	1.200		
	121/100	0	10.800		
	121/89	0	12.000		
	107/107	1	0.020		
	107/100	0	0.360		
	107/86	0	0.400		
	100/100	9	1.620		
	100/86	1	3.600		
	86/86	10	2.000		
AK-2 (CTC pH 8.0) L	117/117	0	0.200	0.690	2
	117/100	1	1.960		
	100/100	49	48.020		
PGDH-1 (CTC pH 8.0) L	100/100	49	38.720	13.398	2
	100/98	0	10.560		
	98/98	1	0.720		
PGDH-2 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50.000	0.000	
EST-1 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50.000	0.000	
EST-2 (CTC pH 8.0) L	104/104	0	0.405	1.960	2
	104/100	5	8.190		
	100/100	45	41.405		
EST-3 (CTC pH 8.0) L	100/100	43	36.980	36.818	2
	100/94	1	12.040		
	94/94	6	0.980		
AK-2 (CTC pH 8.0) K	200/200	0	1.28	1.814	2
	200/100	16	13.44		
	100/100	34	35.280		

ตารางที่ 9 (ต่อ)

โลกัส	อัลลีล	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.
PGDH-2 (CTC pH 8.0) K	106/106	13	3.380	85.464	5
	106/100	0	17.420		
	106/97	0	1.820		
	100/100	33	22.445		
	100/97	1	1.690		
	97/97	3	0.245		
PGI (TEM pH 8.3) K	100/100	35	36.125	1.557	2
	100/44	15	12.750		
	44/44	0	1.125		
PGM (TEM pH 8.3) K	110/110	0	0.980	1.325	2
	110/100	14	12.040		
	100/100	36	36.980		
ME (CTC pH 8.0) K	100/100	45	40.500	50.617	5
	100/63	0	8.100		
	100/38	0	0.900		
	63/63	4	0.405		
	63/38	1	0.090		
	38/38	0	0.005		
EST-2(CTC pH 8.0) H	121/121	10	3.125	26.889	2
	121/100	5	18.750		
	100/100	35	28.125		
EST-2 (TEB pH 8.3) H	108/108	0	0.980	1.325	2
	108/100	14	12.040		
	100/100	36	36.980		
TOTAL				373.099**	44

CTC pH 8.0 : บัฟเฟอร์ Tris-citrate pH 8.0
TEB pH 8.3 : บัฟเฟอร์ Tris-EDTA-borate pH 8.3
M : กล้ามเนื้อ
L : ตับ
K : ไต
H : หัวใจ

ตารางที่ 10 ไคมีสแควร์ของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำในจังหวัดปัตตานี

โล่กัส	อัลลิล	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.
ME (CTC pH 8.0) M	100/100	42	35.280	4.762	2
	100/75	8	13.140		
	75/75	0	1.280		
EST-3 (CTC pH 8.0) M	120/120	0	1.125	0.138	2
	120/100	5	4.750		
	100/100	45	45.125		
AK-1 (CTC pH 8.0) L	121/121	9	0.980	78.11	2
	121/100	0	12.04		
	100/100	41	36.980		
AK-2 (CTC pH 8.0) L	117/117	0	0.500	1.802	2
	117/100	6	9.000		
	100/100	44	40.500		
PGDH-1 (CTC pH 8.0) L	102/102	8	1.620	41.975	2
	102/100	0	14.760		
	100/100	42	33.620		
PGDH-2 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50.000	0.000	
EST-1 (CTC pH 8.0) L	100/100	40	41.405	0.853	2
	100/95	10	8.190		
	95/95	0	0.405		
EST-2 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50	0.000	
EST-3 (CTC pH 8.0) L	100/100	50	50	0.000	
AK-2 (CTC pH 8.0) K	200/200	0	0.125	0.138	2
	200/100	5	4.750		
	100/100	45	45.125		
PGDH-2 (CTC pH 8.0) K	106/106	14	3.920	50.000	2
	106/100	0	20.160		
	100/100	36	25.920		
PGI (TEM pH 8.3) K	100/100	35	36.980	1.854	2
	100/44	15	12.040		
	44/44	0	0.980		
PGM (TEM pH 8.3) K	110/110	0	0.72	0.929	2
	110/100	12	10.56		
	100/100	38	38.72		

ตารางที่ 10 (ต่อ)

โล่กัศ	อัสลัส	Observed Frequency	Expected Frequency	Chi square	df.
ME (CTC pH 8.0) K	100/100	38	28.280		
	100/63	0	17.480		
	100/38	0	0.760		
	63/63	11	2.645		
	63/38	1	2.578		
	38/38	0	0.005	50.095	5
EST-2(CTC pH 8.0) H	100/100	50	50.000	0.000	
EST-2 (TEB pH 8.3) H	108/108	0	0.500		
	108/100	10	8.600		
	108/85	0	0.400		
	100/100	36	36.980		
	100/85	4	3.440		
	85/85	0	0.080	1.325	5
TOTAL				231.981**	30

P<0.01

CTC pH 8.0 : บัฟเฟอร์ Tris-citrate pH 8.0

TEB pH 8.3 : บัฟเฟอร์ Tris-EDTA-borate pH 8.3

M : กล้ามเนื้อ

L : ตับ

K : ไต

H : หัวใจ


TOTAL

ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิทธิ์ genetic identity และ genetic distance ของประชากรปลาสดจาก
แหล่งน้ำ 5 แหล่ง

ประชากร	สมุทรปราการ	พิษณุโลก	สุพรรณบุรี	อุบลราชธานี	ปัตตานี
สมุทรปราการ	***	0.015	0.029	0.055	0.073
พิษณุโลก	0.985	***	0.028	0.060	0.080
สุพรรณบุรี	0.972	0.972	***	0.033	0.058
อุบลราชธานี	0.946	0.942	0.968	***	0.073
ปัตตานี	0.930	0.923	0.943	0.929	***

ตัวเลขใต้เครื่องหมาย *** คือค่าของ Nei (1978) unbiased genetic identity

ตัวเลขเหนือเครื่องหมาย *** คือค่าของ Nei (1978) unbiased genetic distance



ภาพที่ 9 รูปแบบความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของประชากรปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

SAMUTPRAKAN = สมุทรปราการ, PITSANULOK = พิษณุโลก
SUPAN = สุพรรณบุรี, UBON = อุบลราชธานี
PATTANEE = ปัตตานี

การทดลองที่ 3

ศึกษาลักษณะภายนอกของปลาสดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

ลักษณะภายนอกตัวอย่างปลาสดที่รวบรวมจากแหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการ พิชณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานีและปัตตานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะภายนอกของตัวอย่างปลาสดที่รวบรวมจากแหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 50 ตัว มีความยาวลำตัวมาตรฐาน 14.0-14.6 เซนติเมตร ความยาวหัว 3.9-4.1 เซนติเมตร อัตราส่วนความยาวหัวต่อความยาวลำตัวมาตรฐานเท่ากับ 0.28 ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 7 อัน และก้านครีบอกอ่อน 10 อัน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 10-12 อัน และก้านครีบอกอ่อน 36-37 อัน ครีบหางมีก้านครีบอ่อน 14-16 อัน จำนวนเกล็ดบนเส้นข้างลำตัว 55-57 อัน ลำตัวมีสีเหลืองและมีลายขวางลำตัวจำนวน 9-13 แถบ (ภาพที่ 10a)

ลักษณะภายนอกของตัวอย่างปลาสดที่รวบรวมจากแหล่งน้ำในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 50 ตัว มีความยาวลำตัวมาตรฐาน 9.7-10.3 เซนติเมตร ความยาวหัว 3.1-3.3 เซนติเมตร อัตราส่วนความยาวหัวส่วนความยาวลำตัวมาตรฐานเท่ากับ 0.32 ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 7 อัน และก้านครีบอกอ่อน 9 อัน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 10 อัน และก้านครีบอกอ่อน 36-38 อัน ครีบหางมีก้านครีบอ่อน 17 อัน จำนวนเกล็ดบนเส้นข้างลำตัวเท่ากับ 47-56 อัน ลำตัวมีสีเหลืองเทาและมีลายขวางลำตัว 14 แถบ (ภาพที่ 10b)

ลักษณะภายนอกของตัวอย่างปลาสดที่รวบรวมจากแหล่งน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 50 ตัว มีความยาวลำตัวมาตรฐาน 13.7-14.3 เซนติเมตร ความยาวหัว 3.8-4.0 เซนติเมตร อัตราส่วนความยาวหัวส่วนความยาวลำตัวมาตรฐานเท่ากับ 0.28 ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 7 อัน และก้านครีบอกอ่อน 9 อัน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 10 อัน และก้านครีบอกอ่อน 35 อัน ครีบหางมีก้านครีบอ่อน 17 อัน จำนวนเกล็ดบนเส้นข้างลำตัวเท่ากับ 57 อัน ลำตัวมีสีเหลืองเทาและมีลายขวางลำตัว 15 แถบ (ภาพที่ 10c)

ลักษณะภายนอกของตัวอย่างปลาสดที่รวบรวมจากแหล่งน้ำในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 ตัว มีความยาวลำตัวมาตรฐาน 15.9-16.8 เซนติเมตร ความยาวหัว 4.3-4.5 เซนติเมตร อัตราส่วนความยาวหัวส่วนความยาวลำตัวมาตรฐานเท่ากับ 0.27 ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 7 อัน และก้านครีบอกอ่อน 9 อัน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 10 อัน และก้านครีบอกอ่อน 36 อัน ครีบหางมีก้านครีบอ่อน 17 อัน จำนวนเกล็ดบนเส้นข้างลำตัวเท่ากับ 49-56 อัน ลำตัวมีสีเหลืองเทาและมีลายขวางลำตัว 14-15 แถบ (ภาพที่ 10d)

ลักษณะภายนอกของตัวอย่างปลาสดที่รวบรวมจากแหล่งน้ำในจังหวัดปัตตานี จำนวน 50 ตัว มีความยาวลำตัวมาตรฐาน 16.7-17.4 เซนติเมตร ความยาวหัว 4.5-4.7 เซนติเมตร อัตราส่วน

ความยาวหัวส่วนความยาวลำตัวมาตรฐานเท่ากับ 0.27 ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 7 อัน และก้านครีบอก 10 อัน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 10 อัน และก้านครีบอก 37 อัน ครีบท้องมีก้านครีบอก 3 อัน ครีบท้องมีก้านครีบอก 15 อัน จำนวนเกล็ดบนเส้นข้างลำตัวเท่ากับ 48-56 อัน ลำตัวมีสีเหลืองเทา และมีลายขวางลำตัว 12-14 แถบ (ภาพที่ 10e)


เมื่อนำความยาวหัวและความยาวลำตัวมาตรฐานมาคิดเป็นอัตราส่วนความยาวหัวต่อความยาวลำตัวมาตรฐานและนำมาเปรียบเทียบความแตกต่างของปลาผลิตจากแหล่งต่างๆ ปรากฏว่าสามารถแบ่งปลาผลิตได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) พิษณุโลก (2) สมุทรปราการและสุพรรณบุรี และ (3) อุบลราชธานีและปัตตานี โดยแต่ละกลุ่มมีอัตราส่วนความยาวหัวต่อความยาวลำตัวมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) ปลาผลิตจากสมุทรปราการและสุพรรณบุรีไม่มีความแตกต่างกัน ปลาผลิตจากอุบลราชธานีและปัตตานีก็ไม่มีความแตกต่างกันเช่นกัน (ตารางที่ 12)

ตารางที่ 12 อัตราส่วนความยาวหัวต่อความยาวลำตัวมาตรฐานของประชากรปลาผลิตจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

แหล่งน้ำในจังหวัด	ความยาวหัว/ความยาวลำตัวมาตรฐาน
สมุทรปราการ	0.28 ^b
พิษณุโลก	0.32 ^a
สุพรรณบุรี	0.28 ^b
อุบลราชธานี	0.27 ^c
ปัตตานี	0.27 ^c

a, b, c, d ตัวอักษรต่างกันในแนวดิ่ง แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

ภาพที่ 10 ตัวอย่างปลาผลิตที่รวบรวมจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง (บน : ตัวผู้ : ล่าง : ตัวเมีย)
(a) สมุทรปราการ (b) พิษณุโลก (c) สุพรรณบุรี (d) อุบลราชธานี และ (e) ปัตตานี



ภาพที่ 10 ตัวอย่างปลาชนิดที่รวบรวมจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง (บน : ตัวผู้ ; ล่าง : ตัวเมีย)

(a) สมุทรปราการ (b) พิษณุโลก (c) สุพรรณบุรี (d) อุบลราชธานี และ (e) ปัตตานี

6. วิจารณ์ผล

5.1 สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ไอโซไซม์ของปลาสด

การหาชนิดของไอโซไซม์ บัฟเฟอร์ และอวัยวะที่เหมาะสมของปลาสดเป็นขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ไอโซไซม์เพื่อหาข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคทางสตาซเจลิอิเล็กโตรโฟเรซิส

ไอโซไซม์ AK สามารถใช้วิเคราะห์ไอโซไซม์ของปลาสดได้เมื่อใช้ตับหรือไตเป็นอวัยวะในการทดสอบในบัฟเฟอร์ CTC pH 8.0 Criz และคณะ (1982) รายงานว่าเมื่อทดสอบในปลา *Tilapia (C.) zillii* ตรวจพบไอโซไซม์นี้ที่ตับ ganad สมอง ตา และกล้ามเนื้อ และใน cichlid fish พบได้ในตับ กล้ามเนื้อและหัวใจ (Van der Bank และคณะ, 1992) ส่วนในปลาสดจะปรากฏผลชัดเจนที่กล้ามเนื้อ (พนม, 2537)

ไอโซไซม์ EST สามารถใช้วิเคราะห์ไอโซไซม์ของปลาสดได้ เมื่อใช้กล้ามเนื้อในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB pH 8.3 และ CTC pH 8.0 Li และคณะ (1993) รายงานว่าใน blunt snout bream ตรวจสอบไอโซไซม์นี้ได้เมื่อใช้ตับเป็นอวัยวะทดสอบ ในปลาไนสีจะพบไอโซไซม์นี้ที่ตับ (Sumantadinata และ Taniguchi, 1990 ; Brody และคณะ, 1979) ในปลาสดควรใช้กล้ามเนื้อและเลือดในการตรวจสอบ (พนม, 2537) ส่วนปลา rainbow trout พบว่าไอโซไซม์นี้ทำงานได้ดีที่หัวใจ (Vander Bank และคณะ, 1992)

ไอโซไซม์ PGI สามารถใช้วิเคราะห์ไอโซไซม์ของปลาสดได้ในทุกอวัยวะและทุกชนิดของบัฟเฟอร์ที่ทำการศึกษา พบว่าในปลาไนสีไอโซไซม์นี้ทำงานได้ดีที่กล้ามเนื้อและหัวใจ (Sumantadinata และ Taniguchi, 1990) พนม (2537) พบไอโซไซม์นี้ที่กล้ามเนื้อและตับในปลานิล ส่วนปลา rainbow trout พบไอโซไซม์นี้ที่กล้ามเนื้อ (Taggart และคณะ, 1981) และที่ตา (Van der Bank และคณะ, 1992)

ไอโซไซม์ ME สามารถใช้วิเคราะห์ไอโซไซม์ของปลาสดทุกอวัยวะและทุกบัฟเฟอร์ที่ทำการศึกษายกเว้นเมื่อใช้เลือดทดสอบ ส่วนปลานิลพบไอโซไซม์นี้ที่กล้ามเนื้อและตับ (พนม, 2537)

ไอโซไซม์ PGDH สามารถใช้วิเคราะห์ไอโซไซม์ของปลาสดเมื่อใช้ตับและไตในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC pH 8.0 และเลือดในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB pH 8.0 ในปลานิลจะพบผลชัดเจนที่กล้ามเนื้อ (พนม, 2537) ส่วนปลา rainbow trout พบได้ในตับ (Van der Bank และคณะ, 1992)

ไอโซไซม์ PGM สามารถใช้วิเคราะห์ไอโซไซม์ของปลาสดเมื่อใช้ตับในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB pH 8.3 และตรวจสอบพบในกล้ามเนื้อของปลาไนสี (Sumantadinata และ Taniguchi, 1990) และในปลา rainbow trout (Van der Bank และคณะ, 1992)

5.2 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสลิดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

ประชากรปลาสลิดที่รวบรวมจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง มีความแตกต่างและคล้ายคลึงกันที่รูปแบบของไอโซไซม์และค่าทางพันธุกรรม

ไอโซไซม์ AK ของปลาสลิดในไถมีรูปแบบของไอโซไซม์คล้ายคลึงกับที่พบในหอย (Durand และคณะ, 1993) ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตีที่โลกัส AK-1 ของประชากรปลาสลิดจากอุบลราชธานีและสมุทรปราการมีค่าสูงสุดและต่ำสุดตามลำดับ แสดงว่าประชากรปลาสลิดจากอุบลราชธานีมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมน้อยที่สุดที่โลกัสนี้ และประชากรจากสมุทรปราการมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมมากที่สุด ส่วนประชากรปลาสลิดจากพิษณุโลกมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่โลกัส AK-2 น้อยที่สุด และประชากรจากอุบลราชธานีมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่า genetic identity ของโลกัสนี้ พบว่าประชากรจากอุบลราชธานีมีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างจากประชากรแหล่งอื่น ๆ

ไอโซไซม์ EST ของปลาสลิดพบว่ามี 1 โลกัส กล้ามเนื้อมี 2 อัลลีล มีโลกัสเป็นแบบโพลิมอร์ฟิก ส่วนหัวใจมี 3 อัลลีล มีปฏิกิริยาเพียงประชากรเดียวที่มีโลกัสเป็นแบบโมโนมอร์ฟิก นอกนั้นเป็นโพลิมอร์ฟิก ที่จับพบ 3 โลไซเช่นเดียวกับที่พบในปลา blunt snout bream (Li และคณะ, 1993) ส่วนในปลาไนจับพบเพียง 1 โลกัส มี 2-3 อัลลีล (Sumantadinata และ Taniguchi, 1990) โครงสร้างโมเลกุลของไอโซไซม์นี้เป็นโมโนเมอร์ ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตีของประชากรจากสุพรรณบุรีและปัตตานีมีค่าสูงสุดแสดงว่ามีความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่โลกัส EST-1 นี้ต่ำที่สุด ประชากรจากสมุทรปราการมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่โลกัส EST-2 ต่ำสุด ประชากรจากสมุทรปราการและอุบลราชธานีมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่โลกัส EST-3 ต่ำสุด จากค่า genetic identity ของทั้ง 3 โลกัส พบว่าประชากรจากทุกแหล่งมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม

ไอโซไซม์ ME ของปลาสลิดที่กล้ามเนื้อพบว่ามี 1 โลกัส 2-3 อัลลีล เป็นแบบโพลิมอร์ฟิก ในสารละลายบัฟเฟอร์ CTC แต่เป็นแบบโมโนมอร์ฟิกในสารละลายบัฟเฟอร์ TEB ซึ่งแตกต่างจากปลา common carp ที่พบไอโซไซม์นี้ถึง 2 โลกัส (Sumantadinata และ Taniguchi, 1990) ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตีของประชากรจากอุบลราชธานีมีค่าต่ำที่สุด แสดงว่ามีความแปรปรวนทางพันธุกรรม ณ โลกัสนี้สูงสุด ค่า genetic identity ณ โลกัสนี้แสดงให้เห็นว่าประชากรจากทุกแหล่งมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม

ไอโซไซม์ PGDH ของปลาสลิดที่จับพบว่ามี 2 โลไซ 4 อัลลีล โดยตัวอย่างจากทุกประชากรเป็นโฮโมไซโกตและมีสภาพโลกัสเป็นโมโนมอร์ฟิก ที่จับพบเพียงโลกัสเดียวมี 1-3 อัลลีล และโลกัสมีสภาพเป็นโมโนมอร์ฟิก Sodsuk (1993) และ McAndrew และ Majumdar (1983) พบไอโซไซม์นี้ที่กล้ามเนื้อมี 1 โลกัส ในปลาทุกชนิดและพบแถบ 3 แถบ ในตัวอย่างที่เป็นเฮตเทอโรไซโกต ซึ่งชี้

ให้เห็นถึงโครงสร้างโมเลกุลว่าเป็นแบบไดเมอร์ และจากค่า genetic identity ที่โลกัส PDGH-1 แสดงให้เห็นว่าประชากรจากปัตตานีมีความแตกต่างทางพันธุกรรมจากประชากรอื่น ๆ

ไอโซไซม์ PGI ของปลาสลิดที่โตพบว่ามี 1 โลกัส 2 อัลลีล และมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบไดเมอร์ ในหอยพบ 1 โลกัสเช่นเดียวกับปลาสลิดแต่มีถึง 9 อัลลีล (Duran และคณะ, 1993) ในปลา brown trout สามารถใช้โลกัส PGI-2 เป็น genetic maker สำหรับจำแนกประชากรจากแม่น้ำออกจากประชากรอื่น ๆ (Martinez และคณะ, 1993) และในปลา common carp พบไอโซไซม์นี้ถึง 3 โลกัสที่กล้ามเนื้อและหัวใจ ซึ่งสามารถใช้เป็น genetic maker ได้เช่นกัน (Sumantadinata และ Taniguchi, 1990) ค่า genetic identity ของปลาสลิดจากการศึกษานี้ แสดงว่าประชากรจากพิษณุโลกมีพันธุกรรมแตกต่างจากประชากรอื่น ๆ

ไอโซไซม์ PGM ของปลาสลิดที่โตและหัวใจพบว่ามี 1 โลกัส 2 อัลลีล ไอโซไซม์นี้ที่กล้ามเนื้อของปลา common carp พบว่ามี 1 โลกัส 2 อัลลีล ในประชากรจากญี่ปุ่นและมี 3 อัลลีล ในประชากรจากอินโดนีเซีย (Sumantadinata และ Taniguchi, 1990) ค่า genetic identity ที่โลกัสนี้ของปลาสลิดแสดงให้เห็นว่าประชากรจากทุกแหล่งมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม

ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตีโดยเฉลี่ยแต่ละประชากรพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วง 0.217 - 0.253 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง และจำนวนอัลลีลโดยเฉลี่ยต่อโลกัสมีค่าน้อยเท่ากับ 1.92 - 2.17

ค่า genetic identity ของทุกโลไซซึ่งคำนวณตามวิธีของ Nei (1978) ระหว่างประชากรของสมุทรปราการและพิษณุโลกมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.985 และมีค่า genetic distance ต่ำสุดเท่ากับ 0.028 แสดงให้เห็นว่าประชากรจากสมุทรปราการมีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกับประชากรจากพิษณุโลกมากที่สุด ส่วนประชากรจากพิษณุโลกมีความแตกต่างทางพันธุกรรมจากประชากรปัตตานีมากที่สุด เมื่อนำค่าสัมประสิทธิ์ genetic similarity และ genetic distance มาทำเป็น dendrogram เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ จะพบว่าประชากรจากจังหวัดปัตตานีมีความแตกต่างทางพันธุกรรมจากประชากรแหล่งอื่น ๆ ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ สมุทรปราการ พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี และปัตตานี ตามลำดับ เมื่อพิจารณาค่า genetic identity ของทุกคู่ประชากรที่มีค่าอยู่ในช่วง 0.923 - 0.985 ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียง 1.00 แสดงให้เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าประชากรปลาสลิดจาก 5 แหล่งนี้มีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมอยู่มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขยายพื้นที่การเลี้ยงปลาสลิดจากภาคกลางไปยังภาคอื่น ๆ ทำให้มีการเคลื่อนย้ายพันธุ์ปลาสลิดโดยเฉพาะจากจังหวัดสมุทรปราการไปยังแหล่งอื่น ๆ อันเป็นผลทำให้ประชากรมีความคล้ายคลึงกัน และจากการทดสอบค่าไคมีสแควร์ของประชากรปลาสลิดจากแหล่งน้ำทั้ง 5 แหล่ง พบว่าประชากรปลาสลิดทั้ง 5 แหล่งนี้ไม่อยู่ในสมมุติฐานของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก ซึ่งอาจเนื่องมาจากการขยายพื้นที่การเลี้ยงปลาสลิดไปยังจังหวัดอื่น ๆ และมีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสลิดมากขึ้น โดยมีการนำพันธุ์ปลาที่เลี้ยง

ไว้ในฟาร์มมาเพาะพันธุ์ นอกจากนี้ปลาสลิดจากฟาร์มเหล่านั้นอาจหลุดรอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอันเป็นสาเหตุให้ประชากรปลาสลิดไม่อยู่ในสมดุลงด่งกล่าว

5.3 ความแตกต่างของลักษณะภายนอกของปลาสลิดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง

จากการเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของปลาสลิดจากแหล่งน้ำ 5 แหล่ง โดยใช้อัตราส่วนความยาวหัวต่อความยาวลำตัวมาตรฐานเป็นหลัก พบว่าปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการและสุพรรณบุรีมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ไอโซไซม์ที่พบว่าประชากรจาก 2 แหล่งนี้มีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม การที่ประชากรจาก 2 แหล่งน้ำมีความคล้ายคลึงกันทั้งลักษณะภายนอกและพันธุกรรม เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดสุพรรณบุรีมากที่สุดและมีการเลี้ยงปลาสลิดที่คล้ายคลึงกัน จึงอาจมีการนำพันธุ์ปลาจากจังหวัดสมุทรปราการไปเลี้ยงที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปลาสลิดจากจังหวัดอุบลราชธานีและปัตตานีก็มีความคล้ายคลึงกันทั้งลักษณะภายนอกและพันธุกรรมเช่นกัน ส่วนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปัตตานีมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมและลักษณะภายนอก ปลาสลิดจากจังหวัดพิษณุโลกถึงแม้จะมีพันธุกรรมคล้ายคลึงกับปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด แต่มีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกัน

6. สรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 สามารถใช้ไอโซไซม์ 6 ชนิด คือ ไอโซไซม์ AK, EST, ME, PGDH, PGI และ PGM ในการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสลิด โดยใช้อวัยวะกล้ามเนื้อ ตับ ไต และหัวใจ และสารละลายบัฟเฟอร์ Tris Citrate pH 8.0 และ Tris – EDTA – Borate pH 8.3

6.2 ประชากรปลาสลิดจากแหล่งน้ำทั้ง 5 แหล่ง มีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม โดยประชากรปลาสลิดจากแหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการและพิษณุโลกมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมมากที่สุด ส่วนประชากรปลาสลิดจากแหล่งน้ำในจังหวัดพิษณุโลกและปัตตานีมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมมากที่สุด

6.3 ปลาสลิดจากแหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการและสุพรรณบุรีมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกัน ปลาสลิดจากแหล่งน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีและปัตตานีก็มีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกัน ส่วนประชากรปลาสลิดจากจังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะภายนอกแตกต่างจากปลาสลิดแหล่งอื่น ๆ

6.4 ปลาสลิดจากแหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการและสุพรรณบุรีมีความคล้ายคลึงกันทั้งทางพันธุกรรมและลักษณะภายนอก ส่วนปลาสลิดจากแหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการและปัตตานีมีความแตกต่างกันทั้งทางพันธุกรรมและลักษณะภายนอก

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ คุณธงชัย ธรรมเสถียร คุณสมนึก คงรัตน์ ธรรมชาติฟาร์ม จังหวัดสุพรรณบุรี คุณจินตนา ดำรงไตรภพ และคุณอำพร ศักดิ์เศรษฐ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการรวบรวมตัวอย่างปลาสดจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษานี้

8. เอกสารอ้างอิง

- กรมประมง. 2536. การศึกษาชีววิทยาของปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี. สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด, กรมประมง. 26 น.
- กรมประมง. 2541. สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี พ.ศ. 2538. กองเศรษฐกิจการประมง เอกสารฉบับที่ 9/2541. 57 น.
- เจียมจิตต์ บุญสม. 2532. การเลี้ยงปลาสดในพื้นที่ดินพรุและการแปรรูป. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ. กรมประมง. 20 น.
- ธนิต ผิวนิม. 2528. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแยกสารทางชีวเคมี" คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร. 65-89 น.
- ธวัชชัย งามสันติวงศ์. 2537. SPSS / PC + หลักการและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสถิติเพื่อการวิจัย. โรงพิมพ์ลิ้นคอรัน, กรุงเทพมหานคร. 601 น.
- บุญ อินทร์มพรรย์. 2523. ปลาสด (เรื่องเก่าเล่าใหม่). ราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพมหานคร. 21 น.
- บุญยรัตน์ จันทร์สว่าง. 2523. ชีวประวัติปลาสด. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ. กรมประมง. 30 น.
- พนม กระจำพจน์ สอดสุข. 2537. ข้อมูลทางพันธุกรรมสำหรับตรวจสอบปลาในกลุ่มปลานิล 4 ชนิดโดยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิส. วารสารการประมง 47 : 525 – 539.
- เผติม ระติสุนทร และประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ. ไม่ปรากฏปีที่ตีพิมพ์. พันธุศาสตร์ปริมาณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 190 น.
- วิไลลักษณ์ นุชประมูล, กังวาล ทรัพย์อาจิณ, วชิร หิรัญยะวิสิต, วารุณี เกียรติดุริยกุล, บังอร ณ พัทลุง, ทวีสุข กรรณล้วน, อัมรินทร์ ปรีชาวุฒิ, สุพรรณิ ศานติวิชัย, ปราณิต ประวัติเมือง และสุวัฒน์ มั่นสวัสดิ์. 2528. อิเล็กโตรโฟรีซิสทางการแพทย์. คณะเทคนิคการแพทย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร. 53 น.
- อุทัยรัตน์ ณ นคร. 2535. การเพาะขยายพันธุ์ปลา. คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 239 น.

- Abersold, P. B., G. A. Winans, D.J. Teel, G.B. Milner and F.M. Utter. 1987. Manual for starch gel electrophoresis : A method for the detection of genetic variation. U.S. Department of Commerce. 20 p.
- Almeda – Val, V. M. F. D., M . D. N. P. D. Silva, M. C. D. M. Caraciolo, L. S. B. D. Mesquita, I. P. Farices and A. I. Val. 1992. LDH – isozymes in Amazon fish – III. Distribution patterns and function properties in Serrasalminidae (Teleostei : Ostariophysi). Comp. Biochem. Physiol. 103B (1) : 119 – 125.
- Basaglia, F. 1991. Malate dehydrogenase isozymes in fifteen Sparidae species (Perciformes, Teleostei). Comp. Biochem. Physiol. 98B (1) : 9-19.
- Brodey, M. M. and S. H. Bishop. 1979. Malate dehydrogenase isoforms from Ribbed mussel (*Modiolus demissus*) gill tissue. Comp. Biochem. Physiol. 100B (4) : 775 – 782
- Creech, S., 1991. An electrophoretic investigation of populations of *Atherina boyeri* Risso, 1810 and *A. presbyter* Cuvier, 1829. (Teleostei : Atherinidae) : genetic evidence in support of the two species. J. Fish Biology 39 : 807 – 816.
- Cross, T. f., R. D. Ward and A. Abreu – Grobots. 1979. Duplicate loci and allelic variation for mitochondrial malic enzyme in the Atlantic salmon, *Salmo salar* L. Comp. Biochem. Physiol. 62B : 403 – 406.
- Crozier, W. W. and J. J. Moffett. 1990. Inheritance of allozyme in Atlantic salmon (*Salmo salar* L.). Aquaculture 88 : 253 – 262.
- Dey A. C. 1984. Distribution of malate dehydrogenase in different tissues of rainbow trout (*Salmo gairdneri*) of different ages. Comp. Biochem. Physiol. 77B : 675 – 678.
- Durand, P., K. T. Wanda and F. Blanc. 1993. Genetic variation in wild and hatchery stocks of the black pearl oyster, *Pinctada margaritifera*, from Japan. Aquaculture 110 : 27 – 40.
- Harris, H. and D. A. Hopkinson. 1977. Handbook of enzyme electrophoresis in human genetics. New York. 303 p.
- Harlt, D. L. and A. G. Clark. 1989. Principles of population genetics. Sinauer Associates, Inc. Pub. Sunderland, Massachusetts, U.S.A. 682 p.

- Koljonen, M. L. 1986. The enzyme gene variation of ten Finnish rainbow trout strains and the relation between growth rate and mean heterozygosity. *Aquaculture* 57 : 257 – 260.
- Kyriakopoulou – Sklavounou, P., Y. Karakousis and B. Alexiou. 1992. A morphometric and electrophoretic study of two populations of *Hyla arborea* L. in Greece. *Comp. chem. Physiol.* 103b : 715 – 719.
- Leider, S. A., P.L. Haulett, J.J. Loch and M. W. Chilcote. 1990. Electrophoretic Comparison of the reproductive success of naturally spawning transplanted and wild Steelhead trout through the returning adult stage. *Aquaculture* 88 : 239 – 252.
- Li, Sifa., W. Cai and B. Zhou. 1993. Variation in morphology and biochemical genetic markers among populations of blunt snout bream (*Megalobrama amblycephala*). *Aquaculture* 111 : 117 – 127.
- Low, W. P., S. F. Chew and Y.K. Ip. 1992. Differences in electrophoretic patterns of lactate dehydrogenases from the gills, hearts and muscles of three mudskippers. *J. of Fish Biology* 40 : 975 – 977.
- McAndrew, B. J. 1992. Lecture notes on population genetics. AADCP / WP / 16, 45 pp.
- Macaranas, J. M. 1991. A practical laboratory guide to techniques and methodology of electrophoresis and its application to fisheries management. Philippines council for aquatic and marine research and development, Philippines. 47 pp.
- Martinez, P., J. Arias, J. Castro and L. Sanchez. 1993. Differentially stocking incidence in brown trout (*Salmo trutta*) populations from northwestern Spain. *Aquaculture* 114 : 203 – 216.
- Nei, M. 1978. Estimation of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals. *Genetics* 89 : 583 – 590.
- Pasteur, N., G. Pasteur, F. Bonhomme, J. Catalan and J. Britton – Davidian. 1988. Practical isozyme genetics. 215 pp.
- Salvatorelli G., F. Basaglia, A. Santulli, P. Ferioli, V. D'Amelio and Basciano. 1987. Evolution of some enzymatic patterns during development in *Sparus aurata*. *Acta. Embryol. Morphol. Expn.* 8 : 299 – 305.

- Sodsuk, P. K. 1993. Molecular genetics and systematic of tilapiine cichlids using allozymes and morphological characters. PhD thesis, University of Stirling, Scotland. 308 pp.
- Sumantadinata, K. and N. Taniguchi. 1990. Comparison of electrophoretic allele frequencies and genetic variability of common carp stocks from Indonesia and Japan. *Aquaculture* 110 : 41 – 50.
- Swofford, D. L. 1989. Biosys – 1, A Computer Program for the Analysis of Allelic Variation in Population Genetics and Biochemical Systematics. Illinois, U.S.A. 43 pp.
- Taggart, J., A. Ferguson F.M. Mason. 1981. Genetic variation in Irish populations of brown trout (Salmo trutta L.) : Electrophoretic analysis of allozymes. *Comp. Biochem. Physiol.* 69B : 393 – 412.
- Teugels, G. G., R. Guyomard and M. Legendre. 1992. Enzymatic variation in African clariid catfishes. *J. Fish. Biology* 40 : 87 – 96.
- Van der Bank, F. H., M. K. J. Swart and T. Ferreira. 1992. Genetic variation in nine rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) populations in South Africa. *Comp. Biochem. Physiol.* 103B : 495 – 499.
- Van Der Bank, F. H., W. S. Grant and J. T. Ferrenira. 1989. Electrophoretically detectable genetic data for fifteen southern African cichlids. *J. of Fish Biology* 34 : 465 – 483.
- Whitmore, D. H. 1990. Electrophoresis and Isoelectric Focusing Techniques in Fisheries Management. CRC. Press, Florida. 350 pp.

9. ภาคผนวก

9.1 ส่วนประกอบสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ไอโซไซม์

1) ไอโซไซม์ Aspartate amino transferase (AAT) : EC. 2.6.1.1

0.2 M Tris / HCl pH 8.0	20	ml
L – aspartic acid	50	ml
α - ketoglutaric acid	25	mg
ปรับ pH 8.0 ด้วย NaOH แล้วเติม		
Pyridoxal – 5' – phosphate	5	mg
Fast Blue BB	30	mg
2% Agar ใน 0.2 M Tris / HCl pH 8.0	12.5	ml
(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991)		

2) ไอโซไซม์ Adenylate kinase (AK) : EC. 2.7.4.3

Glucose	50	mg
ADP	20	mg
NADP	1	ml
MgCl ₂ (1M)	200	μ l
MTT	1	ml
PMS	1	mg
HK 20 unit	2.8	μ l
G6PDH 14 unit	5.6	μ l
0.2 M Tris / HCl pH 8.0	20	ml
2% Agar	20	ml
(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)		

3) ไอโซไซม์ Esterase (EST) : EC. 3.1.1.1

α - naphthyl acetate	10	mg
β - naphthyl acetate	10	mg
(ละลายใน acetone 2 % ปริมาณ 1 ml และน้ำกลั่น 1 ml)		
Fast blue RR	10	mg
0.1 M PO ₄ pH 6.5 – 7.0	20	ml

2% Agar 20 ml
(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)

4) ไอโซไซม์ Fumarase (FUM) : EC. 4.2.1.2

Fumaric acid 30 mg
NAD 2 ml
MTT 1 ml
PMS 1 ml
MDH 40 unit 12 μ l
0.2 M Tris / HCl pH 8.0 20 ml
2% Agar 10 ml
(Pasteur และคณะ, 1988 ; Whitmore, 1990)

5) ไอโซไซม์ Glucose dehydrogenase (GCDH) : EC 1.1.1.47

D - Glucose 4.5 g
NAD 1 ml
MTT 1 ml
PMS 1 ml
0.1 M phosphate pH 7.0 10 ml
2% Agar 10 ml
(Whitmore, 1990)

6) ไอโซไซม์ Hexokinase (HK) : EC. 2.7.1.1

Glucose 60 mg
MgCl 1 ml
ATP 15 mg
NADP 1 ml
MTT 1 ml
G6PDH 14 20 μ l
0.2 M Tris / HCl pH 7.0 10 ml
PMS 1 ml
2% Agar 20 ml
(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)

7) ไอโซไซม์ L – Iditol dehydrogenase (IDDH) : EC. 1.1.1.14

Sorbitol	50	mg
NAD	1	ml
MTT	1	ml
PMS	1	ml
0.2 Tris / HCl pH	10	ml
2% Agar	10	ml

(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)

8) ไอโซไซม์ Malate dehydrogenase (MDH) : EC. 1.1.1.37

substrate solution	3	ml
NAD	1	ml
MTT	1	ml
0.2 M Tris / HCl pH 8.0	10	ml
2% Agar	10	ml

substrate solution : DL – Malic acid 13.4 g + H₂O 50 ml ปรับ pH ให้เท่ากับ 7.0

ด้วยโซเดียมคาร์บอเนต (Na₂CO₃) แล้วเติมน้ำให้ได้ 100 ml เก็บเป็น stock solution

(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)

9) ไอโซไซม์ Malic enzyme (ME) : EC. 1.1.1.40

(Malate dehydrogenase – NADP dependent)

substrate solution	5	ml
10% MgCl ₂	1	ml
NADP	1	ml
NBT	20	mg
PMS	1	ml
0.1 M Tris / HCl pH 8.0	10	ml
2% Agar	10	ml

substrate solution : DL – Malic acid 13.4 g + H₂O 50 ml ปรับ pH ให้เท่ากับ 7.0

ด้วยโซเดียมคาร์บอเนต (Na₂CO₃) แล้วเติมน้ำให้ได้ 100 ml เก็บเป็น stock solution

(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)

10) ไอโซไซม์ Mannosephosphate isomerase (MPI) : EC. 5.3.1.8

(Mannose – 6 phosphate isomerase)

Mannose – 6 – phosphate 10 mg

NADP 1 ml

MTT 1 ml

1 M MgCl 50 μ l

PMS 1 ml

0.2 M Tris / HCl 8.0 10 ml

G6PDH 50 unit 10 μ l

GPI 50 unit 10 μ l

(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)

11) ไอโซไซม์ Glucosephosphate isomerase (GPI) : EC. 5.3.1.9

(PHI = Phosphohexose isomerase; Oxoisomerase; Phosphoxomutase)

(HPI = Hexosephosphate isomerase)

(Glucose – 6 – phosphate isomerase)

(PGO = Phosphoglucosomerase)

(Phospho saccharomutase)

(D – glucose – 6 – lectol isomerase)

Fructose – 6 - phosphate 10 mg

NADP 1 ml

1M MgCl₂ 50 μ l

MTT 1 ml

PMS 1 ml

G6PDH 250 unit / ml 10 μ l

0.2 M Tris / HCl pH 8.0 10 ml

2% Agar 10 ml

(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)

12) ไอโซไซม์ Phosphogluconate dehydrogenase(PGDH) : EC.1.1.1.44

(6 – Phosphogluconic dehydrogenase) ;

6 – phosphogluconic acid 80 mg

NADP 1 ml

1 M MgCl_2 200 μl

MTT 1 ml

PMS 1 ml

0.2 M Tris / HCl pH 8.0 15 ml

2% Agar 15 ml

(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)

13) ไอโซไซม์ Phosphoglucomutase (PGM) : EC. 5.4.2.2

(Glucose phosphomutase)

Glucose 1 – phosphate (Na_2 salt) 50 mg

NADP 1 ml

1 M MgCl_2 200 μl

MTT 1 ml

PMS 1 ml

G6PDH 50 unit 200 μl

0.2 M Tris / HCl pH 8.0 15 ml

2% Agar 15 ml

(Pasteur และคณะ, 1988 ; Macaranas, 1991 ; Whitmore, 1990)

14) ไอโซไซม์ Pyruvate kinase (PK) : EC. 2.7.1.40

Phospho (elno) pyruvate (Na_3 salt) 15 mg

Fructose – 1' 6 – diphosphate (Na_4 salt) 15 mg

ADP 25 mg

NADP 20 mg

KCl 80 mg

1 M MgCl_2 1 ml

Lactate dehydrogenase 100 unit 10 μl

0.2 M Tris / HCl pH 8.0 15 ml

2% Agar 15 ml

$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 50 mg

(Pasteur และคณะ, 1988 ; Whitmore, 1990)

9.2 สารละลายบัฟเฟอร์

1) Tris – Citrate (CTC)

Tris	83.2 g
Citric acid	33 g
เติมน้ำ	1,000 ml

ปรับ pH ให้เท่ากับ 8.0 เก็บเป็น stock solution

gel buffer : stock solution 10 ml : H₂O 300 ml

Electrode buffer : stock solution 60 ml : H₂O 250 ml

(Pasteur และคณะ, 1988)

2) Tris – EDTA – Borate (TEB)

700 mM Tris	84.77 g
500 mM Boric acid	30.92 g
20 mM EDTA	7.45 g

ปรับ pH ให้เท่ากับ 8.0 หรือ 8.3 เก็บเป็น stock solution

Cathode (-) electrode buffer : dilute 1 : 5 with distilled water 50 : 250 ml

Anode (+) electrode buffer: dilute 1 : 7 with distilled water 75 : 525 ml

(Market และ Faulhaber, 1965)

9.3 การคำนวณค่าสถิติ

1) Expected heterozygosity (unbiased estimate of Nei, 1978)

การคำนวณค่าเฮเทอโรไซโกซิตีที่มีสูตรดังนี้

$$h = 2n (1 - \sum p_i^2) / (2n - 1)$$

ขณะที่ค่าเฉลี่ยเฮเทอโรไซโกซิตีที่ทุกโลไซมีสูตรคำนวณคือ

$$H = \sum h_k / r$$

โดยที่ p_i คือค่าความถี่ของแต่ละอัลลีล ณ โลกัสหนึ่ง ๆ ของแต่ละตัวอย่างในกลุ่มประชากร

h_k คือค่าเฮเทอโรไซโกซิตีของโลกัสตำแหน่ง k

r คือจำนวนโลไซทั้งหมดที่ทำการศึกษา

n คือจำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มประชากร

$$S.E. = \sqrt{\text{Var}}$$

$$\text{Var} = \sum (h_k - H)^2 / r(r - 1)$$

2) Genetic distances (Unbiased genetic distance ของ Nei, 1978)

เมื่อ x_i และ y_i เป็นความถี่ของอัลลีลที่ i ของกลุ่มประชากร x และ y Nei

(1978)'s unbiased genetic distance สามารถคำนวณได้ตามสูตรดังนี้

$$D_n = -\ln (J_{xy} / \sqrt{J_x J_y})$$

เมื่อ J_{xy} , J_x และ J_y คือ arithmetic means across loci of $x_i y_i$, $(2n_x \sum$

$x_i^2 - 1) / (2n_x - 1)$ และ $(\sum y_i^2 - 1) / (2n_y - 1)$ ตามลำดับ

กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ