




การใช้ปลานักล่า

ควบคุมและกำจัดปลาหมอสีคางดำ

ปลากะพงขาว

Lates calcarifer (Bloch, 1790)



ขนาดลูกปลาหมอสีคางดำ
ที่ปลากะพงขาวสามารถกินได้



ปลาอีกร

Mystus gulio (Hamilton, 1822)



ข้อเสนอแนะการใช้ปลานักล่า

1. การปล่อยปลาผู้ล่าลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ต้องมั่นใจว่าแหล่งน้ำนั้นมีปลาหมอสีคางดำแพร่ระบาดมาก เพราะปลานักล่าจะกินสัตว์น้ำพื้นเมืองเช่นกัน
2. ควรปล่อยปลากะพงขาวขนาดความยาว 3-5 นิ้วขึ้นไป เพื่อกำจัดลูกปลาหมอสีคางดำที่มีขนาดแรกฟักความยาวไม่เกิน 7 เซนติเมตรได้ โดยสามารถกินได้ 7-20 ตัว ในรอบ 1 วัน
3. การปล่อยปลานักล่าลงเลี้ยงร่วมกับกุ้งทะเลเพื่อกำจัดปลาหมอสีคางดำนั้น ควรปล่อยปลานักล่าที่มีขนาดใหญ่ และปล่อยในสัดส่วนที่น้อยกว่ากุ้งทะเลอย่างน้อย 3-6 เท่า

ปลานักล่าชนิดอื่น




ปลาช่อน

Channa striata



ปลากดเหลือง

Hemibagrus nemurus



QR code หนังสือประชาสัมพันธ์
เรื่อง สัตว์น้ำคางดำ