



สรุปลานการณัการเกิดโรคสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 1-28 เมษายน 2560

กุ้งขาวแวนนาไม

จากการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อวินิจฉัยโรคที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงครามในช่วงวันที่ 1-28 เมษายน 2560 มีทั้งหมด 2 ฟาร์ม พบว่ากุ้งขาวแวนนาไมทั้ง 2 ฟาร์ม (100%) ไม่เกิดโรค
สรุปลผล ในเดือน เมษายน 2560 กุ้งขาวแวนนาไม ไม่เกิดโรค

ปลากะพงขาว

จากการสุ่มตัวอย่างและจากเกษตรกรส่งตรวจปลากะพงขาวเพื่อวินิจฉัยโรคที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงครามในช่วงวันที่ 1-28 เมษายน 2560 มีทั้งหมด 4 ฟาร์ม พบปลากะพงขาวเกิดโรคจากปรสิตโดยพบโรคเห็บกระชัง 3 ฟาร์ม (75%) และไม่เกิดโรค 1 ฟาร์ม (25%)

สรุปลผล ในเดือน เมษายน 2560 สาเหตุการเกิดโรคในปลากะพงขาว ส่วนใหญ่เป็นปรสิตภายนอกชนิดเห็บกระชัง

อาการของปลาที่ถูกเห็บกระชังเกาะ

- จะทำให้ผิวหนังเกิดแผล ปลาจะขยับเมื่อออกมาจากบ่อ ผิวหนังจะเป็นดวงขาวๆ
- ถ้าเกาะปลาที่มีเกล็ด จะทำให้เกล็ดปลาหลุดและเกิดแผล
- ถ้าเกาะตามครีบ จะทำให้ครีบขาดกร่อน
- ถ้าเกาะเหงือก จะทำให้เหงือกบวมหรือเป็นแผลและขาดกร่อน

การป้องกันรักษา

- การป้องกันหน้าจะดีกว่าการรักษา เพราะปรสิตชนิดนี้แพร่ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ปลาตายได้ในระยะเวลาสั้นๆ การป้องกันทำได้โดยการตรวจปลาก่อนที่จะนำมาเลี้ยงว่ามีปรสิตติดมาด้วยหรือไม่ ระมัดระวังการติดต่อระหว่างบ่อผ่านทางอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ควรขังปลาไว้ประมาณ 2-3 วัน เมื่อตรวจแน่ใจแล้วจึงปล่อยปลาลงเลี้ยง
- **การรักษา** ถ้าเกิดเป็นโรคให้ ให้กำจัดได้โดยการใช้อาหรือสารเคมี คือ ฟอ์มาลิน 150-200 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร แช่ไว้นาน 1 ชม. หรือ 25-50 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตรนาน 24 ชม.