

ปริมาณและน้ำหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่ายในจุดสำรวจต่างๆ ( CPUE ครั้งที่ ...3.....)

จุดสำรวจ CPUE จากเครื่องมือข่ายในแหล่งน้ำ.....แม่น้ำปิง.....ตำบล...ศรีวารีย์.....อำเภอ แมริม..... จังหวัด.....เชียงใหม่..... lat.(UTM).....long.(UTM)..... พื้นที่แหล่งน้ำ ณ ช่วงเวลาสำรวจ.....125,000.....ไร่  
จุดสำรวจ...หน้าหน่วย...สุ่มตัวอย่าง วันที่...7... เดือน.....มิถุนายน.... พ.ศ....2560.....เวลาลงข่าย.....16.00.....น. เวลากู้ข่าย.....06.00.....น. ระยะเวลาการลงข่าย .....12.....ชั่วโมง

| ชนิด         | Scientifics name                 | ข่าย 2.0 ซม. |               | ข่าย 3.0 ซม. |               | ข่าย 4.0 ซม. |               | ข่าย 5.5 ซม. |               | ข่าย 7.0 ซม. |               | ข่าย 9.0 ซม. |               |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|              |                                  | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) |
| กระมัง       | <i>Puntioplites proctozyston</i> |              |               |              |               |              |               | 0.06         | 2.84          |              |               |              |               |
| เขยงแถบขาว   | <i>Mystus albolineatus</i>       |              |               | 0.08         | 2.47          |              |               |              |               |              |               |              |               |
| จาด          | <i>Hypsibarbus malcolmi</i>      |              |               |              |               |              |               | 0.06         | 13.26         | 0.07         | 12.57         |              |               |
| ไส้ตันตาแดง  | <i>Cyclocheilichthys apogon</i>  |              |               | 0.08         | 1.65          |              |               |              |               |              |               |              |               |
| หนามหลัง     | <i>Mystacoleucus marginatus</i>  |              |               | 0.49         | 7.00          | 0.09         | 3.70          |              |               |              |               |              |               |
| <b>ผลรวม</b> |                                  |              |               | <b>0.66</b>  | <b>11.11</b>  | <b>0.09</b>  | <b>3.70</b>   | <b>0.13</b>  | <b>16.10</b>  | <b>0.07</b>  | <b>12.57</b>  |              |               |

ปริมาณและน้ำหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่ายในจุดสำรวจต่างๆ ( CPUE ครั้งที่ .....3.....)

ข้อมูลสำรวจ CPUE จากเครื่องมือข่ายในแหล่งน้ำ.....แม่น้ำปิง.....ตำบล.....แก่งค้อ.....อำเภอ ลี้..... จังหวัด.....ลำพูน..... lat.(UTM).....long.(UTM)..... พื้นที่แหล่งน้ำ ณ ช่วงเวลาสำรวจ.....125,000.....ไร่  
จุดสำรวจ...หน้าหน่วย...สุ่มตัวอย่าง วันที่...8... เดือน.....มิถุนายน.... พ.ศ....2560.....เวลาลงข่าย.....16.00.....น. เวลากู้ข่าย.....06.00.....น. ระยะเวลาการลงข่าย .....12....ชั่วโมง

| ชนิด          | Scientifics name                   | ข่าย 2.0 ซม.  |               | ข่าย 3.0 ซม. |               | ข่าย 4.0 ซม. |               | ข่าย 5.5 ซม. |               | ข่าย 7.0 ซม. |               | ข่าย 9.0 ซม. |               |
|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|               |                                    | จำนวน(ตัว)    | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) | จำนวน(ตัว)   | น้ำหนัก(กรัม) |
| กระมัง        | <i>Puntioplites proctozysron</i>   | 3.33          | 7.61          | 0.66         | 5.84          |              |               |              |               |              |               |              |               |
| กระแห         | <i>Barbobymus schwanefeldi</i>     | 0.19          | 4.63          | 2.06         | 35.76         | 1.85         | 42.96         |              |               |              |               |              |               |
| ช่า           | <i>Labiobarbus leptocheilus</i>    | 0.19          | 0.93          |              |               | 0.09         | 4.63          | 0.06         | 10.10         |              |               |              |               |
| ตะเพียนขาว    | <i>barbobymus gonionotus</i>       |               |               |              |               |              |               |              |               | 0.07         | 13.23         |              |               |
| ตาหมิ่น       | <i>Amblyrhynchichthys micraca</i>  | 3.89          | 20.56         | 0.25         | 4.12          |              |               |              |               |              |               |              |               |
| เนื้ออ่อน     | <i>Phanacronotus bleekeri</i>      |               |               |              |               |              |               | 0.06         | 3.79          |              |               |              |               |
| ปีกโก้นวดยาว  | <i>Kryptopterus paraschilbeide</i> | 0.19          | 0.93          |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
| แป้นแก้ว      | <i>Parambassis siamensis</i>       | 138.15        | 237.11        | 6.58         | 25.21         | 0.37         | 1.48          |              |               |              |               |              |               |
| แปบควาย       | <i>Paralaubuca harmandi</i>        | 4.81          | 36.30         | 1.73         | 27.45         |              |               |              |               |              |               |              |               |
| สร้อยขาว      | <i>Henicorhynchus siamensis</i>    |               |               | 0.41         | 4.53          | 0.28         | 6.94          |              |               |              |               |              |               |
| สร้อยลูกกล้วย | <i>Labiobarbus leptocheilus</i>    | 0.19          | 1.85          |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
| สังกะวาดขาว   | <i>Laides longgibarbis</i>         | 14.44         | 160.94        | 0.82         | 21.40         | 0.09         | 4.63          |              |               |              |               |              |               |
| ไส้ตันตาขาว   | <i>Cyclocheilichthys repasson</i>  | 0.56          | 2.78          |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
| ไส้ตันตาแดง   | <i>Cyclocheilichthys apogon</i>    |               |               | 0.08         | 0.82          |              |               |              |               |              |               |              |               |
| หนามหลัง      | <i>Mystacoleucus marginatus</i>    | 1.11          | 3.70          |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
| หมูขาว        | <i>Yasuhikotakia modesta</i>       | 0.19          | 0.56          |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
| <b>ผลรวม</b>  |                                    | <b>167.22</b> | <b>477.89</b> | <b>12.59</b> | <b>125.13</b> | <b>2.69</b>  | <b>60.65</b>  | <b>0.13</b>  | <b>13.89</b>  | <b>0.07</b>  | <b>13.23</b>  |              |               |