



# สรุปอาการและความเสียหายของเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้งทะเล

อาการ	ตัวแดง WSSV	เอสเอสไอวี SHIV	ทอราซินโดรม TSV	แคระแกร็น IHHNV	หัวเหลือง YHV	ตับวายเฉียบพลัน AHPND (EMS)	อีเอสพี EHP
ลำไส้ว่าง	++++	+++	++	-	+++	+++	-
ซีขาว	-	-	-	-	-	++	+
ตับซีด	+	++	-	-	+++	++++	-
ตับฝ่อ	-	-	-	-	++	++++	++
ตับเหลว	-	-	-	-	++	++++	-
ตัวนึ้ม	-	-	-	+	+	+	+++
ตัวแดง	++++	++	+++	-	+	-	-
ดวงขาว	++	-	-	-	-	-	-
กล้ามเนื้อขาว	++	+	-	-	+	++	-

เห็นได้ว่าบางโรคมีอาการป่วยคล้ายคลึงกัน  
ไม่สามารถยืนยันได้ด้วยอาการ  
ควรติดต่อหน่วยงานประมงในพื้นที่ให้ช่วย  
ตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อขอรับคำแนะนำใน  
การแก้ไขปัญหา



โรคบางโรคมีอัตราการตายสูง บางโรคเลี้ยง  
ไม่โต และปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดี  
ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นทางเลือกที่  
เกษตรกรควรพิจารณา

ความเสียหาย	ตัวแดง WSSV	เอสเอสไอวี SHIV	ทอราซินโดรม TSV	แคระแกร็น IHHNV	หัวเหลือง YHV	ตับวายเฉียบพลัน AHPND (EMS)	อีเอสพี EHP
ระยะที่ได้รับผลกระทบ	เจริญเติบโต	>1 เดือน	โรงอนุบาล	โรงอนุบาล	>1 เดือน	< 1 เดือน	ตลอดช่วง การเลี้ยง
อัตราการตาย (%)	30-80	60-80	0-80	0-80	60-80	90-100	ไม่ตาย
ลักษณะการตาย	ขอบบ่อ	ก้นบ่อ	-	-	ก้นบ่อ	ก้นบ่อ	ไม่ตาย
โตช้า	-	-	++	++	-	+	++++
ปัจจัยโน้มนำการเกิดโรค	ความเครียด	ความเครียด	ความเครียด	ความเครียด	ไม่ทราบ	สภาพพื้นบ่อ	ไม่ทราบ



Download เอกสาร